

Kỹ thuật trồng giống cam chín sớm CS1

Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao (trung bình đạt 27 - 30 tấn quả/ha)...

- Nguồn gốc: Giống cam CS1 do Th.S Nguyễn Xuân Hồng, Th.S Phạm Ngọc Lin và cộng sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi (Viện Nghiên cứu Rau quả) chọn lọc cá thể từ quần thể cam trồng tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Giống đã được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức từ tháng 2/2017.

- Đặc điểm: Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao (trung bình đạt 27 - 30 tấn quả/ha). Thời gian cho thu hoạch quả từ 15 - 20/10. Khối lượng quả trung bình đạt 230 gram. Khi chín vỏ quả màu da cam, ruột quả vàng, ít hạt, tép nhỏ, ít xơ, mọng nước, hương thơm, vị ngọt đậm (Brix 10,5%).

- Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: Chọn đất trồng có tầng canh tác dày trên 1m, tưới tiêu thuận lợi. Vườn trồng cam nên trồng mít hoặc hồng xiêm làm hàng cây chắn gió. Thời vụ trồng tốt nhất: tháng 2 - 4 và tháng 8 - 9. Mật độ trồng 550 cây/ha. Khoảng cách trồng 4 x 4m/1 cây. Đào hố trồng kích thước 1x1x1m/1 hố.

Lượng phân bón/1 gốc cam từ 1 - 4 năm tuổi là: Urê 100 - 300g; Lân supe 300 - 400g; Kali clorua 70 - 240g (chia đều phân bón cho cây vào các tháng 2; 4; 6; 10 và 12. Riêng phân chuồng bón 50 - 60kg/gốc vào tháng 2 hàng năm.

Làm cỏ, tưới nước, tủ gốc giữ ẩm, đảm bảo độ ẩm đất vườn luôn đạt từ 70 - 75% từ sau cây đậu quả và trong giai đoạn quả lớn. Cắt tỉa 3 lần/năm (sau thu hoạch, vụ xuân và vụ hè), cắt bỏ tất cả những cành nằm sâu trong tán, cành nhỏ, cành gày yếu, cành sâu bệnh, một số cành vượt, cành mọc đan xen nhau và tỉa bỏ các quả nhỏ quả dị hình.

- Sâu bệnh hại chính và thuốc phòng trừ: Sâu vẽ bùa phun Polytrin 440EC khi lộc non mới nhú. Sâu đục cành dùng Supracide 0,2 - 0,25% khi lộc non xuất hiện, hoặc bọm Ofatox 0,1% vào lỗ đục trên cành, sau lấy đất vườn bịt kín miệng vào lỗ. Rệp hại phun DC Tron Plus 0,5% hoặc Supracide 0,2%. Rầy chổng cánh sử dụng dầu khoáng DC Tron Plus 0,5% hoặc dùng Sherpa 0,2% phun trừ. Nhện đỏ dùng một trong các loại DC Tron Plus 0,5%, Pegasus 0,2% hoặc Saromite 0,15%. Bệnh loét cam phun phòng bằng Boocđo 1%. Để phòng trừ sâu đục thân cần vệ sinh vườn, gốc cây sạch sẽ, dùng nước vôi đặc quét gốc cây, bọm Supracide 0,2 - 0,25% vào lỗ có sâu để diệt sâu non.

Cam CS1 sau trồng 3 năm đã bắt đầu cho quả bói, từ sau năm thứ 5 cho năng suất cao sản. Thu hoạch quả vào ngày nắng ráo. Quả thu xong cần để nơi thoáng

mát. Không thu hái quả vào các ngày có mưa, ngay sau mưa hoặc ngày có sương mù, vì chất lượng quả sẽ giảm, dễ bị ẩm thối.