

Một số giải pháp kỹ thuật giúp dừa xiêm ra trái sai và liên tục

Để dừa xiêm ra trái nhiều và liên tục bà con cần lưu ý một số giải pháp kỹ thuật sau:

1. Ánh sáng

Để đảm bảo lượng ánh sáng cho dừa bà con cần chú ý về mật độ trồng dừa hợp lý. Về mật độ trồng, cần bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa cây cách cây và hàng cách hàng tối thiểu 6,5 - 7m, như vậy thì cây dừa có thể nhận đủ ánh sáng để bảo đảm vườn dừa đạt năng suất tốt.

2. Về nước tưới

- Mỗi cây dừa cần từ 15- 20 lít nước/ngày. Nếu bị hạn ở bất kỳ lúc nào quá trình phát triển đều ảnh hưởng lớn đến năng suất và kéo dài đến 2 - 3 năm tiếp theo.

- Nên trồng xen trong vườn dừa bằng các loại cây chịu bóng râm: gừng, nghệ, rau má, diếp cá, cỏ voi... để giữ ẩm và tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Lưu ý khi trồng xen:

+ Trồng cách gốc dừa tối thiểu 2m.

+ Cây chịu bóng râm

+ Không phải cây ký chủ nấm Phytophthora sp như bí đỏ, ớt...

3. Về dinh dưỡng

Nhu cầu dinh dưỡng đối với dừa như sau: K>CL>N >P>Na>Ca.

Đối với dừa xiêm đang cho trái hàng năm bón phân như sau:

Dừa thời kỳ kinh doanh (<i>năm thứ 4 trở đi</i>)	ĐVT	Số lượng
- Phân hữu cơ vi sinh	kg/cây/năm	25 - 30
- Tro trấu	kg/cây/năm	25 - 30
- Muối hạt	gam/cây/năm.	100 – 200

Cách bón phân

- Muối: Bón vào đầu mùa mưa, cho muối vào túi vải thưa bỏ trên ngọn dừa, hoặc trộn với phân hữu cơ vi sinh, tro trấu.

- Phân hữu cơ, tro trấu

+ Cần làm sạch cỏ trong vòng bán kính 2 m quanh gốc trước khi bón phân.

+ Bón vòng tròn: Đào rãnh xung quanh gốc và cách gốc 2m, đào sâu từ 15 – 20 cm, bón phân và lấp đất lại (đối với đất thịt, đất sét).

+ Bón theo hốc: Đào 4-8 hốc nhỏ (kích thước: đường kính 60cm, sâu 20cm) chung quanh gốc dừa, cách gốc khoảng 1m, bón phân xuống hốc, lấp đất lại (đối với đất dốc).

+ Xới nhẹ đất trong vùng tập trung nhiều rễ, cách gốc từ 1,5 m đến 2,5 m (tùy theo tuổi của cây dừa), rải đều, khỏa đất lấp kín phân hoặc phủ mùn dừa hay lá dừa lên trên.

- Thời điểm bón phân: Bón phân vào đầu mùa mưa và giữa mùa mưa trường hợp không có mưa sau khi bón phân phải tưới nước giữ ẩm.

4. Về quản lý sâu bệnh hại

Sâu bệnh hại chính trên dừa xiêm: kiến vương, đuông dừa, bọ cánh cứng...

- Đối với bọ cánh cứng hại dừa:

Áp dụng biện pháp sinh học để hạn chế bọ cánh cứng hại dừa vừa đạt hiệu quả cao và bảo vệ môi sinh môi trường: thả bọ đuôi kim, phun nấm *Metarhizium*, ... hiệu quả nhất là thực hiện vào mùa mưa, ẩm độ cao.

- Đối với kiến vương, đuông dừa:

+ Thường xuyên vệ sinh vườn dừa;

+ Dùng vôi quét kín phần gốc dừa từ một đoạn cao khoảng 1,5 m;

+ Dùng bẫy đèn và lưới bện để bẫy kiến vương vào ban đêm trong các vườn dừa;

+ Các cây dừa bị kiến vương, đuông dừa làm chết phải đốt, tiêu hủy (có thể ngâm dưới nước) hoặc xử lý bằng hóa chất để tránh lây lan./.