

## **Phòng và trị bệnh mất sữa ở lợn nái**

### **1. Xác định nguyên nhân gây bệnh**

- Bệnh mất sữa ở lợn có thể là do các bệnh của tuyến vú như: viêm vú, tắc ống tiết và thải sữa.
- Do khẩu phần ăn thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài.
- Do kế phát từ những bệnh như: viêm mủ tử cung, sốt nhau, sảy thai truyền nhiễm, dịch tả, tụ huyết trùng.
- Do rối loạn nội tiết tố tiết sữa.

### **2. Xác định một số triệu chứng bệnh**

Triệu chứng đầu tiên và rõ rệt nhất đó là lợn mẹ giảm lượng sữa hoặc mất hoàn toàn. Con vật nằm úp bụng xuống nền chuồng và không cho con bú, lợn con lông xù, da thô gầy yếu, nằm mỗi nơi một con đi lại chậm chạp và chết dần.

### **3. Biện pháp phòng bệnh**

- Chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý lợn nái sinh sản đúng quy trình kỹ thuật.
- Điều trị các bệnh tuyến vú, và các kế phát dẫn đến kém sữa.

### **4. Điều trị bệnh**

- Tiêm Oxytoxin liều 3 – 5ml/con vào bắp thịt một lần trong ngày.
- Tiêm kháng sinh BTV – Amocin 150 LA liều 1ml/10kg thể trọng.
- Trộn thức ăn BTV – Kích sữa để giúp nái tăng tiết sữa.