

Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt hiệu quả

1. Chuồng trại

Nên bố trí trên nền đất cao ráo không ngập úng, xa dân cư, tiêu thoát chất thải tốt, có đủ nước, xây theo hướng đông tây.

Độ dốc 2% chuồng không bị ẩm ướt, nên lát bằng gạch chỉ, mái chuồng không quá thấp để chuồng thông thoáng tự nhiên không xây kín xung quanh.

Về kích thước trung bình 12 - 15 m² trở lên.

Máng ăn dốc, dễ rửa không để thức ăn tồn đọng trong máng.

2. Chọn giống

Nên nuôi lợn có tỷ lệ nạc cao. Thân dài, mông nở, bụng thon.

Chú ý: Hạn chế mua nhiều loại giống nhiều nơi về nuôi, phải nắm lý lịch nguồn gốc giống lợn mua về nuôi, lợn phải đều về trọng lượng.

3. Chuẩn bị khi đưa lợn về nuôi

- Trước khi thả lợn: Vệ sinh sạch sẽ quét vôi nền chuồng (tẩy uế xung quanh có đủ nước uống).

- Khi đã mua lợn về nuôi: Nên vào ngày mát, lúc sáng sớm hay chiều tối, thời gian vận chuyển càng ngắn càng tốt.

Cho lợn uống nước ngay sau khi thả vào chuồng, pha cho uống Glucoza hay thuốc điện giải.

Tạo thói quen cho lợn đi đúng chỗ bằng cách hàng ngày quét dọn phân vào nơi quy định, tuyệt đối không được tắm cho lợn ngay.

3.3 Tạo môi trường phù hợp cho lợn: Nhiệt độ, độ ẩm

- Về nhiệt độ phù hợp cho sự sinh trưởng của lợn các giai đoạn:

Trọng lượng (kg)	Nhiệt độ phù hợp (oC)	Ghi chú
10 - 20	23 - 28	Nhiệt độ này là nhiệt độ không khí chuồng nuôi. Nền chuồng khô ráo không bị gió lùa.
20 - 40	20 - 23	
40 - 60	18 - 23	
60 - xuất chuồng	17 - 21	

Nhiệt độ cao khi quá nóng lợn thở nhiều giảm ăn đi phân bừa bãi dẫn đến hậu quả tăng trọng chậm, tiêu tốn thức ăn cao, dễ mắc bệnh.

Chống nóng bằng cách:

- Tạo thông thoáng chuồng nuôi, xây dựng chuồng trại hợp lý.
- Lợp mái bằng vật liệu cách nhiệt, mật độ phù hợp.
- Trồng cây xung quanh chuồng cản gió, chống nóng.

Mật độ phù hợp cho lợn ở các giai đoạn cho lợn thịt:

Trọng lượng (kg)	Mật độ nuôi (con/m ²)	Ghi chú
10 - 20	3 - 3,5	Mùa đông có thể tăng mật độ nuôi lên 1 con cho 2 m ² .
20 - 40	2 - 2,5	
40 - 60	1,5	
60 - xuất chuồng	1	

Khi nhiệt độ thấp: thường lợn xù lông hay nằm trùm lên nhau. Đi phân bừa bãi hay cắn tai, cắn đuôi nhau, tăng trọng chậm, tiêu tốn thức ăn cao dễ mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh hô hấp. Phải che chuồng giữ cho nền chuồng khô ráo không ẩm ướt.

Nếu làm nền chuồng xi măng rất lạnh thường lạnh từ 4,5 – 9⁰C.

Về thức ăn cho lợn nên chọn thức ăn đậm đặc của các công ty thức ăn lớn như: CARGILL, HYDRO, phối hợp thêm cám, ngô, sắn...trên bao bì cám các nhà máy đã hướng dẫn pha trộn.

Về nước uống cho lợn:

Nên đáp ứng nước uống đầy đủ cho loại lợn các lứa tuổi của lợn.

Sau đây là nhu cầu nước uống của các loại lợn:

Trọng lượng (kg)	Lượng nước uống (lít/con/ngày)	
	Mùa đông	Mùa hè
Dưới 7 kg	01	02
7 - 15	02	04
15 - 30	04	08
30 - 60	08	15
60 - xuất	10 - 15	19 - 20

Nên phải đáp ứng đủ nước cho lợn uống.

Về Vacxin và vệ sinh sát trùng chuồng trại:

Lợn con: - 21 ngày tiêm vacxin phó thương hàn.

- 25 - 30 ngày tiêm vacxin *E. Coli* + dịch tả.

- 60 ngày tiêm vacxin dịch tả lợn.

Lợn nuôi thịt: 3 tháng tiêm vacxin dịch tả + tụ máu.