


## Kỹ thuật ươm Gà và phòng bệnh cho Gà



### I. KỸ THUẬT ƯƠM GÀ:

#### 1. Xuống ổ gà con:

Gà con vừa mới nở ra khỏi vỏ không nên cho xuống ổ ngay mà phải để trong máy ấp hay ổ ấp 24 giờ cho khô lông thì mới được đem xuống.

#### 2. Chọn gà con:

- Nếu đi mua gà bán ở chợ hay lò ấp thì không nên chọn mua những con gà nguội hay gà cù là những con gà còn lại đèo đẹt, nhẹ cân, mập nước, gà còn lại quá 2 -3 ngày người bán không chăm sóc, không cho uống nước nên sự trao đổi chất bên trong bị giới hạn hoặc cho ăn quá sớm gà con còn noãn hoàng không tiêu hóa thức ăn được nên dễ dẫn đến trĩn đít.

- Chọn gà mới nở phải chọn những con gà nhanh nhẹn và đều nhau. Da chân sần, mình đầy lông, còn bụi lông tơ dính vào chân. Loại bỏ những con có tật như đầu không sọ, không lông, mù mắt, mỏ chèo, chân què, chân cao chân thấp, bụng mềm căng đầy nước, da bụng mỏng lộ cả ruột bên trong, có vòng đen quanh rốn, chưa phát triển lông vùng bụng, cánh chéo hoặc sệ.

- Gà con trên 1 tuần tuổi thường cắn mổ lẫn nhau có thể do thiếu dinh dưỡng, thiếu chất, lượng nhớt ở mật độ quá chặt, ánh đèn quá chói mắt gà. Nên dùng kẽm cắt 1/3 mỏ trên, gà đã cắt mỏ vẫn ăn uống bình thường nên dùng xanh Methylen sát trùng mỏ để tránh bị nhiễm trùng.

#### 3. Cách cho ăn:

- Gà mới nở không cho ăn liền nên để khoảng 48 giờ sau thì mới tập cho gà ăn vì trong bụng của gà con còn túi trứng noãn hoàng có thể nuôi sống gà trong vòng 3 ngày đầu. Nếu cho gà con ăn sớm sẽ khó tiêu hoá hết noãn hoàng dễ gây nên tình trạng trĩn địt ở gà.

- Trong 2 ngày đầu chỉ cho gà con uống nước, ngày thứ 3 có thể cho gà ăn các loại thức ăn dễ tiêu hóa như: tấm, gạo, mè, . . . .v.v và từ ngày thứ 4 trở đi có thể cho gà ăn các loại thức ăn hỗn hợp.

#### 4. Cách cho uống:

- Cho gà uống nước có pha các loại kháng sinh như: Ampicolifort, Tylanvit C hoặc Amoxypen để phòng ngừa các bệnh cho gà như: thương hàn, tụ huyết trùng, E.Coli, CRD, . . . cho uống thường xuyên, dùng máng úp ngược, để máng trong chuồng ở nhiều nơi và thường xuyên chùi rửa bằng thuốc sát trùng và đem phơi nắng.

## II. QUI TRÌNH PHÒNG BỆNH CHO GÀ:

| TT | Ngày tuổi | Phòng bệnh                                              | Phương thức             |
|----|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 | 1 – 3     | Ngừa bằng kháng sinh như:<br>Ampicolifort hoặc Amoxypen | Cho uống                |
| 02 | 4         | Newcastle lần 1                                         | Nhỏ mắt, mũi            |
| 03 | 7         | Gumboro lần 1                                           | Cho uống                |
| 04 | 10        | Đậu gà                                                  | Tiêm xuyên qua da cánh  |
| 05 | 11,12,13  | Ngừa cầu trùng                                          | Cho uống                |
| 06 | 15        | Cúm gia cầm                                             | Tiêm dưới da cổ hoặc ức |
| 07 | 21        | Newcastle lần 2                                         | Nhỏ mắt, mũi            |
| 08 | 22,23     | Ngừa cầu trùng                                          | Cho uống                |
| 09 | 28        | Gumboro lần 2                                           | Cho uống                |
| 10 | 42        | Tẩy giun                                                | Cho uống                |
| 11 | 60        | Newcastle lần 3                                         | Tiêm dưới da            |

**Lưu ý:** Thời điểm tiêm phòng tốt nhất là vào lúc chiều mát.