

Một số kinh nghiệm nuôi vịt thả đồng

1. Chọn vịt con:

Phải chọn vịt “nóng”, tức là vịt mới nở vừa ráo lông, chân lóng, lông đuôi thẳng, rón khô nhẹ, chúng tỏ vịt nở đúng ngày. Tránh vịt “nguội” khô chân, rón ướt, chéo mỏ rất khó nuôi, tốn hao nhiều.

2. Chăm sóc vịt con:

- Tranh thủ thả ngay vịt xuống nền, không nên để lâu trên nong nia khi bắt về vì vịt cách độ ẩm đất lâu da chân vịt dễ khô khan bước chân đi cứng nhắc không linh hoạt, khó nuôi. Sau đó thả vịt trong từng mảnh rộng theo từng số lượng vịt 100-150 con, phải giữ luôn ẩm áp, tránh để vịt bị lạnh lâu quá dễ chết về sau.

- Khoảng 10 giờ sau khi nở có thể cho vịt ăn tằm trộn với hành xắt nhuyễn. Khối lượng hành khoảng 1/3 khối lượng tằm. Ban đêm cố gắng san vịt ra, không để nằm đè lên nhau khiến vịt yếu ngộp chết hay què chân cẳng.

- Có thể úm bằng đèn bão hay đèn điện, không cần lót nhiều rơm mà chỉ cần một lớp bao cũ, hay lớp rơm mỏng.

* Ngày thứ 2:

- Tiếp tục cho ăn như trên, thả vịt ra tắm nắng.

- Cho vịt uống nước sạch ở trên bờ, sau đó từ ngày thứ 3-4 có thể lùa vịt con xuống mặt nước cạn, sạch khoảng 5 phút rồi lùa lên lại cho vịt quen vừa uống nước vừa tập rĩa lông. Nên làm như vậy nhiều lần trong ngày, vì để muộn quá vịt không quen rĩa lông nên nước đầm lông, vịt có thể bị lạnh yếu và chết.

* Ngày thứ 3 đến thứ 6:

- Thức ăn vẫn là tằm, bột bắp trộn thêm hành khoảng 1/3 khối lượng thức ăn để giữ cơ thể vịt được ẩm áp. Nếu thấy tỷ lệ vịt chết hơi cao thì tăng cường thêm hành đến 1/2 khối lượng thức ăn.

* Ngày 7 đến ngày 15:

- Được 7 ngày, vịt rất nhanh nhẹn, đuôi bắt được côn trùng, có khả năng cho vịt ra đồng gần thường xuyên khi trời nắng ấm và có chỗ bóng mát cho vịt con lên nghỉ ngơi rĩa lông.

- Thức ăn bao gồm gạo lức, bắp xay hay cả cám hỗn hợp và trộn thêm một ít hành xắt nhuyễn nếu trời lạnh và khi thấy vịt con khò khè vào ban đêm, phải tăng thêm lượng hành vào thức ăn.

- Không nên cho vịt ăn bằng máng hẹp, thau mà nên rải đều trên mặt đất, nếu nền không bằng phẳng phải trải bằng tấm nylon hay tờ giấy dày khi cho vịt ăn để vịt không bị sụt mỏ, tránh vịt mạnh tranh ăn làm vịt lớn không đều.

- Ban đêm không cần úm, chỉ nổi mảnh mảnh rộng, che kín gió, ở dưới lót một lớp rơm hay cỏ khô. Nếu có một ngọn đèn bão để vịt thấy đường đỡ rộ lúc đêm.

- Cần bổ sung thêm tép tươi, tôm cua còng băm nhuyễn trộn vào thức ăn cho vịt đến ăn khoảng 4-5 lần một ngày, liên tiếp năm ba ngày cho vịt quen tiếng (ngay cả tiếng dao băm trên thớt), có thức ăn ngon vịt tranh nhau về. Điều này làm đỡ khó nhọc khi chăn dắt sau này.

* 15 ngày trở đi:

- Khi vịt đạt 15 ngày tuổi trở đi có thể tập cho ăn lúa theo tỉ lệ 3 gạo + 1 lúa rải đều cho vịt ăn, hết gạo đến lúa. Khi vịt ăn nhanh, tăng ½ gạo lúc + ½ lúa. Khi vịt trên 1 tháng rưỡi tuổi mới có khả năng mò ăn lúa rơi vãi ở đồng ruộng.

- Khi vịt từ 25 đến 30 ngày tuổi bắt đầu đâm lông “huê” và lông vũ, khi trên 1 tháng tuổi, vịt bẻ tiếng và đâm lông óng. Vịt vàng lớn càng cần có chuồng rộng thoáng, yên lặng, vì lúc này chúng rất nhát và ưa rộ ban đêm.

Nói chung đối với vịt đàn chạy đồng hiện nay, kinh nghiệm bà con rất nhiều nhưng vì tăng trọng vịt có giới hạn chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện trên thị trường đã có nhiều giống vịt lông trắng lớn con nhằm phát triển đàn vịt lai tăng trọng nhanh, bà con có thể xem xét lựa chọn để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.