

## KỸ THUẬT TRỒNG RAU OM

☐☐☐ Rau om có tên khoa học là *Limmophila Chinensis*, ☐ thuộc cây thân thảo, cây có thể cao 15- 20cm. Thân rỗng ruột, giòn. Lá đơn, không cuống có lông, mọc đối. Mép lá hơi có răng cưa.

### **Kỹ thuật trồng:**

☐☐☐\* *Thời vụ:* Cây rau om có thể trồng được quanh năm.

☐☐☐\* *Chuẩn bị đất:* Cây sinh trưởng phát triển mạnh trên những vùng đất trũng như ruộng lầy, ao bùn. Do đó, đất trồng cần nhiều bùn cày bừa, sục bùn kỹ và vệ sinh ruộng trồng sạch ở những vùng đất thấp, trũng với chiều rộng liếp



cm. ☐☐☐\* *Khoảng cách trồng :* Thông thường trồng Om những đoạn thân sinh trưởng khoẻ, không sâu bẻ dài khoảng 15 – 20 cm giâm trực tiếp ngoài ruộng trồng: cây cách cây 3 – 4 cm ☐

☐☐☐\* *Bón Phân:* Phân hữu cơ sinh học và phân lân liều lượng/ha từ 2- 3 tấn phân hữu cơ sinh học, 100 – 150 kg super lân. Phân đạm được dùng để bón thúc cho cây. Sau trồng 10 ngày có thể bắt đầu bón phân cho cây bằng cách tưới với nồng độ loãng và bón định kỳ đến cách ngày thu hoạch ít nhất 10 ngày ☐☐☐

☐☐☐\* *Chăm sóc:* Sau khi giâm cành xong cần tưới nước giữ ẩm, kích thích cây mau ra rễ. Thường xuyên thăm đồng, làm sạch cỏ dại trên ruộng trồng.

☐☐☐\* *Phòng trừ sâu bệnh:* Cây rau om ít có sâu bệnh. Tuy nhiên, thường xuyên theo dõi đồng ruộng để phòng trị kịp thời nếu có xuất hiện sâu, bệnh gây hại. Tùy theo đối tượng sâu bệnh, có thể phòng trị bằng một số loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc BVTV cho phép sử dụng trên cây rau như sau ☐ Prevaton, Ammate, Tập Kỳ 1.8 EC; Vertimec 1.8EC, 084SC; Vibamec 1.8EC; Sitto password 36,2 EC; Biocin 16WP;... Cuzate, Oshin; Daconil 75WP, 500SC; COC 85 WP; Zincopper 50WP; Ridomil 68WP; Ditacin 8L; ....

☐☐☐\* *Thu hoạch:* cây trồng sau 30 -35 ngày thì có thể thu hoạch.