

Phòng trừ bệnh thối ngọn và thối rễ trên cây dứa

1. Đặc điểm nhận biết

Giai đoạn cây con dễ nhiễm bệnh thối ngọn. Đặc điểm nhận biết đầu tiên các lá non có màu vàng hoặc hơi nâu, phần tâm ngọn dứa bị thối làm các lá ngọn bị héo, nhỏ rút lên dễ dàng, chỗ gốc lá bị nhũn nước và thối, có một vạch đen giữa phần lá bị thối và phần chưa bị thối, bẹ lá nơi bị thối có mùi rất hôi.

Bệnh thối rễ làm hệ thống rễ bị chết, các lá bên ngoài trở nên mảnh khảnh và chết dần từ chóp lá vào, cây rất dễ nhỏ do không còn rễ bám

2. Tác nhân gây bệnh :

Bệnh do nấm *Phytophthora cinnamomi* gây nên.

3. Đặc điểm phát sinh phát triển bệnh

Bệnh thường xuất hiện trong mùa mưa trên các ruộng ẩm thấp và đọng nước. Nấm *Phytophthora* lưu tồn trong đất khi gặp mưa nhiều, ẩm độ cao, chúng sinh sản rất nhanh và tấn công bộ rễ, ngọn dứa gây thiệt hại nghiêm trọng.

4. Biện pháp phòng trừ

Mặt luống trồng dứa phải cao ráo, thoát nước tốt. Phải có hệ thống mương rãnh thoát nước trong mùa mưa, không để bộ rễ bị ngập úng.

Làm đất kỹ, phơi ải.

Nên trồng dứa vào những ngày nắng ấm, ít mưa, đất khô ráo.

Khi phát hiện có bệnh hoặc khi điều kiện thuận lợi cho bệnh ở giai đoạn dứa mới trồng hoặc sắp ra hoa gặp trời mưa kéo dài cần phải phun ngừa bệnh bằng thuốc Acrobat 90/600 WP (30 g/bình 8 lít) thường xuyên 10-15 ngày/lần