

## **Phòng và trị bệnh nhiễm khuẩn hình cong tôm đầm**

### **1. Triệu chứng**

Thịt tôm chuyển sang màu trắng đục, ở một số tôm mắc bệnh ngoài vỏ xuất hiện nốt lở loét màu đen, trên mang và trên vỏ ở đầu và ngực, ở bên cạnh bụng đều có vết đen, trên mang dính nhiều vết bẩn màu đen và màu nâu, khi bệnh nặng các lông mang bị thoái hóa, các tổ chức bị bong tuột.

Tôm non mắc bệnh cử động lơờờ, sức vận động giảm sút hẳn, thường chỉ còn bơi chậm chậm dưới đáy ao, không còn khả năng hướng theo ánh sáng. Tôm lớn mắc bệnh thường ngoi lên mặt nước và bơi không định hướng, động tác chậm chạp.

### **2. Nguyên nhân**

Tác nhân gây ra bệnh này là do loại vi khuẩn hình cong (loại vi khuẩn hình cong có tên khoa học là Vibrio).

### **3. Bệnh tích**

Mổ khám thấy gan chuyển từ màu da lươn thành màu trắng, kể cả tôm con và tôm trưởng thành tỷ lệ chết khi mắc bệnh đều lên đến 100%.

### **4. Phòng, điều trị bệnh**

#### Phòng bệnh

- Đối với ao ương giống trước khi đưa vào sử dụng phải khử độc triệt để bằng bột tẩy nồng độ từ 100 – 200 gam/m<sup>3</sup> hoặc Permanganat kali nồng độ từ 10 – 20 gam/m<sup>3</sup>, trước khi dùng phải dùng nước sạch rửa thau nhiều lần cho hết sạch thuốc, đối với nước dùng để ương giống thì phải khử trùng và lọc sạch.

- Trong quá trình ương giống hàng ngày phải tích cực dọn dẹp hết phân bản lắng đọng dưới đáy ao, cho ăn liều lượng vừa phải để phòng thức ăn thừa thối thiu thối.

- Bảo đảm mật độ ương giống thích hợp.

#### Trị bệnh

- Khi xảy ra bệnh dịch rải toàn ao bằng dung dịch Terramycin nồng độ từ 1– 2 gam/m<sup>3</sup> hoặc bột Nitrofurazone nồng độ 0,5 – 1gam/m<sup>3</sup>, cách một ngày rải 1 lần, rải liền 2 – 3 lần.

- Hàng ngày dùng hành tây giã nát và lấy nước lọc sạch pha thành nồng độ từ 5 – 10 gam/m<sup>3</sup> rồi ngâm trong 24 giờ cũng đạt hiệu quả chữa trị tương đối tốt.