

Phòng trị bệnh Gumboro ở gà

1. Nguyên nhân

Bệnh Gumboro là bệnh truyền nhiễm cấp tính của gà do vi rút gây ra, bệnh làm suy giảm miễn dịch của gà. Bệnh lây lan cực nhanh, khi mắc bệnh tỷ lệ gà chết cao, có khi tới 50 - 60%.

2. Triệu chứng

Bệnh chủ yếu xảy ra ở gà dưới 40 ngày tuổi, chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp, tập trung.

- Thể cấp tính: Lúc đầu đàn gà xao xác, mổ cắn lẫn nhau, tự mổ vào lỗ huyết. Cơ vùng hậu môn co bóp mạnh không bình thường. Gà có phản xạ muốn đi ngoài nhưng không thực hiện được. Sau đó không lâu gà sốt cao, đứng chụm vào nhau. Gà uống nhiều nước gây rối loạn tiêu hoá dẫn đến gà đi ỉa chảy nhiều, phân trắng, nhầy đôi khi lẫn máu. Gà mệt mỏi ủ rũ, uể oải, thường chống mỏ xuống đất, tỷ lệ chết cao vào ngày thứ 3, thứ 4, sau đó bệnh thuyên giảm.

- Thể suy giảm miễn dịch (thể ẩn bệnh): Gà giảm sút về sức lực, còi cọc chậm lớn. Sự miễn nhiễm gia tăng với tất cả các bệnh do vi trùng, virus, ký sinh trùng...

3. Bệnh tích

Xuất huyết ở các cơ, đặc biệt là cơ đùi và cơ lườn, túi Fabricius sưng, xuất huyết ở 3-4 ngày đầu, sau đó teo dần lại ở ngày thứ 5-6. Xuất huyết mảng giữa dạ dày tuyến và dạ dày cơ, dạ dày tuyến xuất huyết tràn lan, thận sưng to, ruột bị viêm xuất huyết nặng.

4. Phòng, điều trị bệnh

a. Phòng bệnh:

- Vệ sinh chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng của gà.

- Sử dụng vắc xin: Nhỏ vắc xin Gumboro cho gà vào 5 ngày tuổi và lặp lại vào ngày thứ 25.

- Tăng sức đề kháng cho gà bằng cách: Cho uống Antigum, điện giải, đường glucoza hoặc tiêm kháng thể Gumboro. Khi bệnh ghép với các bệnh khác phải kết hợp cho uống kháng sinh điều trị bệnh ghép.

b. Điều trị bệnh

Bệnh Gumboro là bệnh do vi rút gây ra nên không có thuốc đặc trị.