

## **Phòng trừ nhện đỏ hại cây rau**

### **1. Đặc điểm nhận biết**

- Con trưởng thành dài cỡ 0,5 mm, màu đỏ, có 8 chân.
- Con non nhỏ hơn, cũng có màu đỏ có 8 chân, trứng hình tròn, màu vàng nhạt, rất nhỏ, được đẻ dưới mặt lá.
- Nhện đỏ chuyên sống và gây hại ở mặt dưới lá, trứng cũng đẻ ở mặt dưới lá. Giai đoạn trứng đến trưởng thành kéo dài khoảng 15 ngày.
- Con trưởng thành và con non chích hút nhựa ở mặt dưới lá, có thể xuất hiện trên những lá già làm cho lá bị nhăn, nếu nặng làm lá vàng và rụng sớm, giảm năng suất.

### **2. Đặc điểm gây hại**

- Nhện đỏ gây hại trên nhiều loài cây trồng khác nhau, chúng hại nặng trên các cây như ớt, dưa, bầu bí, đậu đỗ...Nhện trưởng thành và nhện non chích hút lá tạo ra những đốm lá trắng vàng có thể dễ nhận ra ở mặt trên của lá. Khi hại nặng chúng có thể làm lá héo và rụng. Lá bánh tẻ thường bị nhện ăn nặng hơn.
- Nhện đỏ phát triển mạnh khi trời khô hạn, cây được bón nhiều phân đạm.

### **3. Biện pháp phòng trừ**

- Vệ sinh đồng ruộng.
- Bón phân cân đối.
- Luân canh với cây trồng không cùng họ.
- Dùng các thuốc đặc trị: Comite, Nissorun, Rufast, Supracide, Octor,...
- Chú ý việc dùng thuốc hóa học nhiều dễ gây bộc phát nhện đỏ, do tiêu diệt thiên địch của nhện đỏ và nhện đỏ có khả năng quen và kháng thuốc cao.