

Phòng trừ bọ xít hại mướp

1. Đặc điểm nhận biết

- Bọ trưởng thành màu nâu sẫm, hình gần như lục giác, dài 17-18 mm, Mặt lưng phần bụng màu đỏ cam, mỗi mép rìa mặt lưng có 7 chấm đen xen với 7 chấm vàng da cam. Vòi miệng dài như cái vòi hút.

- Trứng hình trụ, đẻ thành ổ khoảng 10-25 trứng xếp thành hàng dài, màu xanh xám đến nâu nhạt

- Bọ non hình dạng giống trưởng thành, không cánh, màu nâu đỏ.

2. Đối tượng gây hại

- Bọ xít chủ yếu phá hại các cây rau họ bầu bí mướp, khổ qua. Bọ trưởng thành và bọ non chích hút nhựa trên cuống lá, cuống nụ, quả non, thân non của cây làm lá bị vàng, rụng sớm hoặc nhỏ, méo mó. Mật độ cao làm giảm năng suất và chất lượng quả.

3. Biện pháp phòng trừ

- Dùng tay giết bọ xít bám trên cây. Ngắt các ổ trứng bọ xít tiêu diệt.

- Dùng thuốc trừ sâu phun trực tiếp vào nơi bọ xít non tập trung. Các loại thuốc trừ sâu thông thường đều có thể diệt được bọ xít: Bassa, Mipcin, Ofatox, Trebon, Midan, Nitox,....