

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG LAN KIẾM (CYMBIDIUM SP.) BẰNG TÁCH NHÁNH

1. Chọn cây tách nhánh:

- Chọn cây mẹ khỏe mạnh, không bị sâu bệnh hại và ít bị tổn thương cơ giới.

2. Dụng cụ tách nhánh:

- Dao, kéo nhọn, keo bôi vết cắt hoặc thuốc sát trùng.

3. Chậu trồng:

- Kích thước 14 x 20 x 20cm, chất liệu nhựa, sứ...

4. Giá thể trồng cây con:

- 2/3 dớn cọng + 1/3 đá sỏi hoặc giá thể 1/3 vỏ lạc + 1/3 vỏ thông + 1/3 đá sỏi.

5. Thời vụ tách nhánh:

- Vụ Xuân

6. Kỹ thuật tách nhánh:

- Vệ sinh cây mẹ và xử lý nấm bệnh bằng Ridomil gold 68WG (nồng độ 50g/10 lít nước). Tách 2-3 nhánh/khóm sau đó nhúng vào dung dịch kích thích ra rễ Trimix-DT super roots nồng độ 20g/10 lít nước.

7. Kỹ thuật trồng chậu:

- Đặt khóm lan đã tách vào chính giữa chậu, cho giá thể đã chuẩn bị sẵn vào chậu đảm bảo giá thể ngập rễ và củ nổi trên giá thể. Tưới đẫm nước cho chậu lan. Đặt chậu cây vào chỗ râm mát khoảng 1-2 tuần.

8. Kỹ thuật chăm sóc cây sau tách nhánh:

- Phân bón lá: Phun B1 (nồng độ 5 ml/10 lít nước) 5 ngày/1 lần để kích thích ra rễ. Trong thời gian này, tuyệt đối không bón phân qua rễ (trong vòng khoảng 1 tháng).

- Ánh sáng: Cường độ ánh sáng tốt nhất 12.000-15.000 lux.

- Bón phân: Sau 1 tháng, dùng phân NPK loại 30:10:10 xen kẽ phân NPK 20:20:20 pha với nồng độ 5 g/10 lít nước, phun và bón định kỳ 5 - 7 ngày 1 lần. Có thể bổ sung các loại hữu cơ ủ mục để trộn lẫn với các giá thể để trồng lan, mức trung bình khoảng 250 - 300gr/chậu.

- Sau 3 tháng có thể xuất vườn, chăm sóc cây bình thường và bổ sung phân chậm tan cho cây với liều lượng 10g/chậu.