

# Kỹ thuật trồng Súp lơ

## 1. Chọn thời vụ và giống trồng

### 1.1. Chọn thời vụ:

- Vụ sớm: Gieo vào tháng 7 - 8 dl trồng vào tháng 9 -10 dl với các giống chính sớm có thể thu hoạch vào tháng 11 - 12.

- Chính vụ: Gieo vào tháng 9 - 10 dl, trồng vào tháng 10-11dl và thu hoạch vào tháng 12 - 1 dl.

- Vụ muộn: Gieo vào cuối tháng 11dl đầu tháng 12 dl, trồng vào cuối tháng 12 dl và thu hoạch vào tháng 2 dl hoặc sang đầu 3 dl□

### 1.2. Giống trồng:□

Sử dụng các giống có năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp với sản xuất và tiêu thụ. Các giống phổ biến có 2 loại:

- Súp lơ đơn: trồng sớm.

- Súp lơ kép: trồng chính vụ và vụ muộn□

## 2. Chuẩn bị cây con:

Lượng hạt giống cần thiết để cung cấp đầy đủ cho 500 m<sup>2</sup> đất trồng là 20 - 30 g. Khi cây con được 25 - 30 ngày tuổi thì nhổ đem trồng. Chọn cây mập, to, lá xanh, gốc đỏ, không bị dị hình rễ đem trồng.

Chú ý : Xử lý cây con trong vườn ươm.

## 3. Chuẩn bị đất:

Luống rộng 0,9 - 1 m, vụ sớm làm luống cao, vụ muộn và chính làm luống thấp và phẳng.

Trồng hàng kép nanh sâu trên luống với khoảng cách 40 x 50 cm hoặc 60 x 50 cm (21.000 - 23.000 cây/ha).

## 4. Bón phân:

- Bón lót cho 500 m<sup>2</sup>:

+ Phân chuồng: 2 tấn.

+ Phân Urea: 3 kg.

+ Phân lân: 2 kg.

+ Phân kali: 4 kg.

Tất cả các loại phân trộn đều nhau rồi bón vào hốc trồng lá tốt nhất.

- Bón thúc cho 500 m<sup>2</sup>:

+ Lần 1: 15 ngày sau khi trồng 1 kg Urea pha nước tưới.

+ Lần 2: 25 ngày sau khi trồng 1 kg Urea pha nước tưới.

+ Lần 3 : Khi cây đã chéo nõn dùng 8 kg Urea pha nước tưới.

## 5. Chăm sóc:

-Tưới tiêu nước: Sau khi trồng tưới nước và sáng sớm và chiều tối cho đến khi cây hồi xanh. Tùy theo thời tiết để tưới giữ ẩm thường xuyên.

- Xới gốc: Sau khi trồng được 15 - 20 ngày xới vun nhẹ lần 1, sau 12 - 16 ngày xới lần 2 đồng thời vun cao gốc.

## 6. Phòng trừ sâu bệnh:

### \* Sâu hại:

Sâu tơ (*Plutella xylostella*), Sâu nhiều đọt (*Hellula undalis*), Sâu ăn tạp (*Spodoptera litura*), Sâu xanh da láng (*Spodoptera exigua*), Bọ nhảy (*Phyllotreta striolata*). Phòng trị như trên cải bắp.

### \* Bệnh hại:

Bệnh thối nhũn, tiêm cùi (do vi khuẩn *Erwinia carotovora*), bệnh cháy lá do vi khuẩn (bã trắng) (do vi khuẩn *Xanthomonas campestris*), Bệnh da lợn hay thối khô (do nấm *Rhizoctonia solani*), bệnh thối hạch (do *Sclerotinia sclerotiorum*), bệnh cháy lá (do nấm *Pellicularia* sp.). Phòng trị như trên cải bắp.

## 7. Thu hoạch:

Thời gian thu hoạch tùy thuộc giống và mùa trồng. Cần thu hoạch đúng lúc mới đảm bảo được năng suất và phẩm chất của Súp lơ.