

Bệnh giun đũa gà

Gà gầy, còi cọc, xù lông, tiêu chảy phân loãng, phân lẫn máu, phân sống do niêm mạc ruột bị tổn thương. Gà gầy, còi cọc, xù lông, tiêu chảy phân loãng, phân lẫn máu, phân sống do niêm mạc ruột bị tổn thương.

1. Căn bệnh:

- Do gà ăn phải trứng giun sán có trong phân, chất độn chuồng, các dụng cụ chăn nuôi,...

- Giun trưởng thành ký sinh trong đường tiêu hóa của gia cầm. Trứng giun được thải ra ngoài theo phân và phân tán rộng khắp ngoài môi trường.

2. Triệu chứng:

- Gà gầy, còi cọc, xù lông, tiêu chảy phân loãng, phân lẫn máu, phân sống do niêm mạc ruột bị tổn thương.

- Gà có các biểu hiện thiếu máu.

- Trong trường hợp nhiễm giun nặng gà có thể chết do giun làm tắc ruột, vỡ ruột hoặc tắc ống mật.

- Ở gà đẻ có hiện tượng giảm nhẹ sản lượng trứng.

3. Bệnh tích:

- Thành ruột dày lên do tăng sinh, nhu động ruột giảm

- Ruột viêm, sung huyết, xuất huyết do giun bám vào hút chất dinh dưỡng

- Trong lòng ruột chứa giun ký sinh, số lượng phụ thuộc vào mức độ nhiễm giun sán

4. Phòng bệnh:

Bước 1: Vệ sinh

- Thức ăn, nước uống và dụng cụ cho ăn, uống phải vệ sinh, tránh nhiễm phân có chứa trứng giun sán.

- Rắc SAFE GUARD 100gr/1m² chuồng để đệm lót luôn khô ráo và khử mùi hôi chuồng.

- Định kỳ vệ sinh, sát trùng chuồng trại bằng ANTISEP liều 3ml/1lít nước.

Bước 2: Dùng thuốc phòng bệnh

VERMIXON tẩy giun sán định kỳ

- 4-6 tuần tuổi: pha nước cho gà uống, liều 15ml/ 50 gà

- Trên 6 tuần tuổi: 30 ml/ 50 gà

- Lặp lại sau 1-2 tháng tùy mức độ nhiễm giun.

Bước 3:

□

☐UNILYTE VIT-C☐liều 2-3gr/1lít nước uống☐

☐ALL- ZYM☐pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ngày, tăng khả năng hấp thu thức ăn, phòng tiêu chảy, phân khô, khử mùi hôi chuồng nuôi.

5. Trị bệnh:

Bước 1: Vệ sinh

☐Thay đệm lót sau khi tẩy giun

☐Rắc SAFE GUARD☐100gr/1m²☐chuồng để đệm lót luôn khô ráo và khử mùi hôi chuồng.

☐Tiêu độc sát trùng chuồng trại, chất độn chuồng bằng☐ANTISEP☐liều 3ml/1lít nước, 2lít phun cho 100m²chuồng☐nuôi.

Bước 2☐Dùng thuốc trị giun sán:

VERMIXON☐tẩy giun gà

☐4 - 6 tuần tuổi:pha nước cho gà uống, liều 15ml/ 50 gà

☐Trên 6 tuần tuổi: 30 ml/ 50 gà

Bước 3:

☐COLI-200☐100gr/ 500kgTT/ngày phòng bệnh đường ruột kể phát

☐UNILYTE VIT-C☐liều 2-3 gr/1lít nước uống, trợ sức, trợ lực cho gia cầm.

☐ALL- ZYM☐pha nước uống liều 1gr/1lít nước, cho uống 3h/ ngày.