

## Bệnh cúm vịt con



### 1. Nguyên nhân:

Bệnh gây ra do một loại virus cúm. Bệnh liên quan đến sức đề kháng của vịt, thường gặp ở những chuồng lạnh, ẩm, dơ, thức ăn có chất lượng kém. Vịt con từ 1-25 ngày tuổi dễ mắc bệnh nhất. Bệnh lây qua thức ăn nước uống hay qua không khí ô nhiễm.

### 2. Triệu chứng:

Hắt hơi, chảy nước mũi, nước mũi lúc đầu trong sau đục đóng ở khe mũi, thở khó.

Kém ăn, gầy yếu, có những cơn co giật.

### 3. Bệnh tích:

Hốc mũi có dịch khô quánh lại, niêm mạc mũi bị xung huyết, phù.

Phổi thủy thũng, một vài nơi xung huyết.

### 4. Phòng bệnh:

Vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống, tránh gió lùa, mưa tạt.

Cho vịt ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng nhất là đạm và thức ăn xanh (Vitamin A).

### 5. Trị bệnh:

Không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Đối với vịt con 5-15 ngày khi mắc bệnh có thể dùng terramycine trộn vào thức ăn với liều 5-10mg/con cho ăn liên tục từ 5-15 ngày làm giảm được tỉ lệ hao hụt và vịt khỏi bệnh tăng trưởng tốt hơn.

Bổ sung Vitamin A vào trong khẩu phần thức ăn.