

## **Kỹ thuật trồng và bón phân cho cây rau muống**

Rau muống có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên, trong mùa mưa rau muống thường bị nhiễm bệnh hơn mùa khô.

### **1. Giống**

– Hiện nay rau muống nước chủ yếu dùng các giống địa phương. Có hai giống: giống thân tím và thân trắng, nhưng giống được thị trường ưa chuộng là giống thân trắng.

– Rau muống nước rất dễ nhân giống, có thể lấy giống từ ruộng rau đang thu hoạch.

– Chọn những đoạn thân bánh tẻ có mang nhiều đọt hoặc có thể tách từng khóm nhỏ mang nhiều nhánh con để trồng.

### **2. Thời vụ**

Rau muống có thể trồng quanh năm. Tuy nhiên, trong mùa mưa rau muống thường bị nhiễm bệnh hơn mùa khô.

### **3. Chuẩn bị đất**

– Có thể trồng rau muống trên nhiều loại đất khác nhau

– Rau muống gieo hạt hoặc trồng cạn lên liếp rộng 1,2 – 1,5 m cao 12 – 15 cm, mùa mưa lên liếp cao hơn khoảng 20 cm.

– Rau muống trồng nước: chuẩn bị đất như đất trồng lúa.

– Trong mùa mưa: rau muống hạt, trồng cạn có thể trồng trong nhà lưới hoặc che phủ bạt nylon để tránh đất cát bám lên cây dễ nhiễm các loại sâu bệnh.

Chú ý: Nên dùng nước sạch tưới cho rau muống. Không nên dùng nước thải khu công nghiệp, khu dân cư tưới cho rau muống.

### **4. Khoảng cách trồng**

– Tùy theo đất trồng, giống và kỹ thuật trồng mà áp dụng mật độ khác nhau.

– Đối với rau muống gieo hạt có thể gieo từ 8 – 10 kg hạt giống/1.000 m<sup>2</sup>.

– Rau muống trồng cạn và rau muống nước có thể trồng với khoảng cách 10 – 15 cm, tùy theo điều kiện đất. Mật độ trồng có thể biến động từ 20.000 – 150.000 chồi/1000 m<sup>2</sup>.

– Khi trồng vùi đất kín 2 – 3 đọt.

– Đối với rau muống sau khi thu hoạch thường để lại gốc thì nên để lại từ 2 – 3 đọt. nếu để lại nhiều đọt thì chồi nhiều nhưng nhỏ.

### **5. Bón phân (tính cho 1000 m<sup>2</sup>)**

Tùy theo đất mà lượng bón khác nhau. Trung bình lượng phân bón như sau:

– Bón lót: phân hữu cơ sinh học

– Bón thúc: Thường dùng urê, sau mỗi lần thu hoạch khoảng 15 – 20 kg urê.

Lưu ý không bón quá nhiều urê, cần bón urê lần cuối vào trước khi thu hoạch ít nhất là 1 tuần.

## **6. Phòng trừ sâu bệnh**

Dịch hại chính trên rau muống là: Ốc bươu vàng, sâu khoang, rầy, bệnh gi trắng, đốm lá, tuyến trùng...

Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp đối với dịch hại rau muống sẽ hiệu quả cao như vệ sinh đồng ruộng, bắt ốc, ngắt bỏ ổ trứng ốc, sâu khoang. Biện pháp che phủ bạt nylon trong mùa mưa, bón phân cân đối có hạn chế ngăn ngừa bệnh hại rau muống có hiệu quả.

Trong mùa mưa nên trồng trong nhà lưới giúp cho cây có khả năng chống bệnh tốt hơn.

Khi sâu bệnh có mật số cao có thể gây hại dùng thuốc BVTV như sau:

– Đối với sâu khoang: Dùng các loại thuốc ít độc như nhóm Abamectin, các loại chế phẩm vi sinh: thuốc có nguồn gốc từ Bt như Biocin, Depel..., có nguồn gốc NPV như Vicin, Seba... hoặc dùng thuốc thảo mộc như Rotenone hoặc Neem. Có thể dùng thuốc gốc Cúc tổng hợp như Sumicindin, Karate, SecSaigon, Sherzol, Sherpa.

– Đối với rầy hại: Dùng Butyl, Trebon, Actara, Oshin...

– Đối với bệnh: có thể dùng Monceren, Ridomyl MZ, Mexyl-MZ, Hạt vàng Thio-M.

Lưu ý: Khi dùng thuốc BVTV phải đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và đảm bảo thời gian cách ly. Không dùng các loại thuốc cấm, nhót cặn trên rau muống.

## **7. Thu hoạch**

Tùy theo mục đích sử dụng. Thời điểm thu hoạch đối với rau muống gieo hạt từ 20 – 30 ngày. Đối với rau muống trồng khoảng cách giữa các lứa thu hoạch từ 18 – 21 ngày.