

## Kinh nghiệm thâm canh hành củ

Hành củ vụ đông đang là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao đối với nông dân nhiều vùng canh tác.

### 1. Xử lý đất và lên luống:

Nếu pH < 6, bà con bón 10 - 15 kg vôi bột/sào; Nếu pH 6,0 - 6,5 thì bón 5 - 7 kg vôi bột/sào; Nếu pH > 6,5 thì không bón vôi.

Luống trồng: Mặt luống rộng 1m. Rãnh rộng 30cm. Luống cao 30 - 35cm

### 2. Giống:

Mỗi sào hành cần 15 - 20 kg giống. Chọn củ chắc, đáy tròn, màu tím đậm, không bị nhiễm bệnh, rễ non chưa mọc, không bị giập nát. Bóc thành từng mũi (ánh hành).

Xử lý củ giống: Nên xử lý củ giống bằng dung dịch thuốc Nativo 750WG nồng độ 1% (3 gr/3 lít nước) + thuốc trừ vi khuẩn Kasumin 2L (1%) phun ướt đều cho hành giống trước khi trồng.

+ Hoặc xử lý củ giống bằng cách ngâm vào dung dịch Rovral 50WP 2% + Kasumin 2L (1%) trong thời gian 5 - 10 phút.

+ Xử lý cây con sau khi trồng để phòng trừ sâu bệnh hại: Pha 1 gói Nativo 750WG (3 g) + 1 gói Confidor 700 WG (1 g) + Kasumin 2L (1%) cho 1 bình 12 lít phun 1,5 bình cho 1 sào Bắc bộ (360 m<sup>2</sup>).

Pha hỗn hợp thuốc để phun hoặc nhúng củ hành cho ướt đều, để ráo rồi cắt nhẹ từ đầu củ xuống và phân rễ khô ở gốc củ khoảng 0,5 cm.

### 3. Kỹ thuật trồng:

Dùng thuốc trừ cỏ Hêcô, Butanic... phun trước khi trồng, trước khi phun phải tưới ẩm mặt luống.

Cắm mũi hành thành 5 hàng dọc theo luống, hàng ngoài cách mép luống 5 - 7cm. Khoảng cách hàng cách hàng 25cm, cây cách cây 20cm đảm bảo mật độ 4.500 - 5.000 củ/sào. Ấn sâu mũi hành xuống đất ngập 2/3 nhánh, sau đó dùng rom, rạ phủ lên trên để giữ ẩm cho đất và hạn chế cỏ mọc (tốt nhất nên dùng rom rạ cũ).

Sau khi trồng và phủ rom rạ xong, tưới đẫm nước trên mặt luống, tiếp tục tưới nước giữ ẩm đến khi cây mọc. Khi cây mọc 3 - 4 lá thật có thể tưới rãnh kết hợp với bón thúc.

### 4. Chăm sóc hành sau trồng:

Lượng phân và cách bón:

Phân hữu cơ hoai mục: 7 - 8 tạ (hoặc 30kg phân vi sinh); Urê: 8 - 9 kg; Phân lân: 25 - 30 kg; Phân kali: 7 - 8 kg/sào Bắc bộ. Chia làm 4 lần bón.

- *Bón lót*: 2 kg urê + 18 kg supe lân + 1 kg kali.

Bón đều trên luống, trộn kỹ với đất san phẳng hoặc bón đều mặt ruộng trước khi làm nhỏ đất lần cuối (không để củ tiếp xúc trực tiếp với phân).

- *Thúc lần 1*: 10 - 15 ngày sau trồng: 2 kg urê + 3,5 kg supe lân + 1 kg kali.

- *Thúc lần 2*: sau lần 1 từ 15 - 20 ngày: 4 kg urê + 5 kg supe lân + 2 kg kali.

- *Thúc lần 3*: ngày sau trồng 55 - 60: 1 kg urê + 3,5 kg supe lân + 3 kg kali.

\* Chú ý:

- Hành tơi rất cần các vi lượng, nếu thấy ruộng hành phát triển kém, đầu lá khô hoặc cong queo thì dùng 1 gói phân vi lượng + 0,5 lạng kali trắng/bình 18 lít phun vào ngày hôm sau khi tưới thúc sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng phân và hạn chế cây bị các loại bệnh.

- Nên kết thúc bón phân sau trồng 50 - 60 ngày kết hợp với tưới hành.

- Thường xuyên giữ ẩm 70 - 80% độ ẩm đất, gió bắc hanh khô cần tưới nhiều, không tưới đẫm khi gió đông để hạn chế bệnh hại.

- Thời kỳ sau trồng 70 ngày hành bắt đầu xuống củ, nếu gặp nhiệt độ cao thì hạn chế tưới nước để tránh cây sinh trưởng trở lại “hành bị rút ruột”. Bổ sung thêm kali trắng (0,5 lạng/bình, 1 lần/tuần) để giúp cây xuống củ thuận lợi và chống bệnh sương mai tốt hơn.

- Vào dịp cuối năm thường có mưa phùn hoặc sương muối, sương giá, vì vậy phải kiểm tra xem nước mưa hay sương có độ pH là bao nhiêu để tác động tránh hiện tượng cháy lá tạo cho vi khuẩn héo xanh, nấm thán thư, sương mai xâm nhập.

+ Nếu pH < 5,5 (môi trường axit chua) cần phun tưới nước vôi trong lên toàn bộ ruộng.

+ Nếu pH > 7 dùng Sunphát đồng phun hoặc pha loãng với liều lượng 1 - 2 lạng/sào để phun tưới mang lại hiệu quả cao.