

Phòng trị bệnh mốc sương hại cây

1. Đặc điểm nhận biết

- Bệnh xuất hiện trên thân, hoa, lá và quả của cây.
- Trên lá vết bệnh thường xuất hiện đầu tiên ở đầu lá, mép lá hoặc gần cuống lá. Vết bệnh lúc đầu hình tròn hoặc hình bán nguyệt, màu xanh tối, về sau không định hình màu nâu đen.
- Ở trên thân, cành vết bệnh ban đầu hình bầu dục nhỏ hoặc hình dạng không định hình, sau đó vết bệnh lan rộng bao quanh và kéo dài dọc thân cành, màu nâu xám hơi lõm và ủng nước.
- Trên hoa vết bệnh màu nâu hoặc màu đen, xuất hiện ở đài hoa ngay sau khi nụ được hình thành.
- Trên quả vết bệnh có thể xuất hiện ở núm hoặc ở giữa quả, lúc đầu màu nâu nhạt sau màu nâu đậm hoặc nâu đen, vết bệnh lan khắp bề mặt quả.

2. Điều kiện phát sinh gây bệnh

- Các điều kiện thời tiết, đất đai, phân bón và kỹ thuật canh tác có ảnh hưởng tới sự phát sinh, phát triển và gây hại của bệnh trên đồng ruộng.
- Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, nhiệt độ ổn định khoảng 20⁰C, trời có mưa phùn, có giọt sương và sau đó trời trở nồm, hứng nắng thì chỉ sau 9- 10 ngày bệnh sẽ phát triển và lây lan trên diện rộng.

3. Biện pháp phòng chống:

- Phòng chống bệnh mốc sương cà chua phải kết hợp các biện pháp: giống chống bệnh, kỹ thuật canh tác và dùng thuốc trừ bệnh.
- Dự tính, dự báo thời gian phát sinh bệnh, phát hiện những ổ bệnh đầu tiên, dùng thuốc boocdo 1% hoặc oxyclozoxim đồng 30WP 0,2% hoặc Zinep 80WP 0,3% phun khi ổ bệnh xuất hiện. Trường hợp bệnh đã phát sinh và điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển mạnh cần sử dụng một trong các thuốc sau: Zinep 80WP 0,3% (2,5 – 3 kg/ha), Ridomil MZ 72 WP (2,5 – 3 kg/ha), Aliette 80WP (0,3%), Pencozeb 80WP (3kg/ha), Antracol 70WP (0,2 – 0,4%), Daconil 75WP (0,25%) để phun diệt trừ nấm bệnh.

- Trong quá trình chăm sóc cần tỉa bỏ lá già dưới gốc

<http://nnptntvinhphuc.gov.vn/index.php?action=details&idmuc=SBHR24>