

## Kỹ thuật chăm sóc cà chua trái vụ

### 1. Làm giàn:

Cắm giàn ngay sau khi trồng (đối với đất phủ nilon) hoặc cắm khi cây cao 50 – 60 cm (đối với đất phủ rơm rạ).

### 2. Bón phân:

- Dùng phân hỗn hợp NPK.
- Giai đoạn đầu cây sinh trưởng chậm, phải bổ sung lượng nhỏ phân đạm và lân.
- Có thể kết hợp phun phân bón lá có hàm lượng các chất trung và vi lượng cao hoặc chứa các axit amin như Agrodream, WEHG...

Lượng phân bón cho 1 sào như sau:

+ Bón lót: trước khi trồng 3 - 7 ngày, vãi đều phân trên mặt đất trước khi lên luống 300 kg phân chuồng hoai mục + 15 kg lân Lâm Thao + 2 kg kali trộn đều hoặc 150 kg hữu cơ vi sinh bón vào hốc.

+ Bón thúc: Bón thúc lần 1: sau khi trồng 3 ngày, bón 30 - 40 kg phân vi sinh Biogro hoặc tưới các chế phẩm kích thích ra rễ xung quanh gốc. Bón thúc lần 2: sau khi trồng 15 ngày, dùng 1 kg urê + 2 kg NPK đầu trâu hoà nước tưới xung quanh gốc. Bón thúc lần 3: sau trồng 35 ngày.

Bón lần 4 sau trồng 60 ngày; lần 5 sau trồng 70 - 80 ngày đối với cây sinh trưởng vô hạn. Lượng bón cho mỗi lần: 1 kg urê + 1 kg kali + 2 kg NPK đầu trâu hoà nước tưới xung quanh gốc.)

### 3. Tưới nước + tỉa chồi:

Sau khi trồng phải tưới nước ngay, hàng ngày dùng gáo tưới cách hốc từ 7-10 cm cho đến khi cây hồi xanh hoàn toàn. Khi cây bắt đầu sinh trưởng mạnh, tưới rãnh từ 7 - 10 ngày/lần.

Tỉa bỏ tất cả các chồi nhánh trên thân chính, chỉ giữ các chồi nhánh mọc dưới nách lá xuất hiện chùm hoa đầu tiên. Khi trên cây đạt số chùm hoa cần thiết thì bấm ngọn và những chồi nách không cần thiết.

### 4. Sử dụng thuốc đậu quả:

Trong điều kiện trồng cà chua trái vụ, sử dụng thuốc đậu quả như CPA, GA3 nồng độ 10 - 15 ppm để phun hoặc nhúng lên chùm hoa. Trong quá trình phun, chú ý không để thuốc bắn lên ngọn sinh trưởng của cây.

### 5. Đối với sâu bệnh:

Bà con cần làm sạch cỏ dại, ngắt bỏ lá già, nhổ cây bị sâu, luân canh với cây trồng họ khác. Dùng thuốc trừ sâu bệnh như: Rhidomin, Benlat, Sherpa..., chú ý nên luân phiên thay thuốc trừ sâu để sâu không quen thuốc. Ngừng phun khi chuẩn bị thu quả.

Bà con chú ý phun theo nồng độ, liều lượng ghi trên bao bì sản phẩm. Nếu trên ruộng xuất hiện cả sâu, bệnh, có thể kết hợp phun thuốc sâu và thuốc bệnh, không pha chung các thuốc gốc đồng như Kocide, Champion.

<http://nnptntvinhphuc.gov.vn/index.php?action=details&idmuc=TSX00148>