

Cách khắc phục hiện tượng Gà, Vịt cắn mổ nhau

Thời tiết nắng nóng kéo dài, thức ăn mất cân đối dinh dưỡng, thiếu nước, môi trường nuôi kém vệ sinh... là một trong những nguyên nhân làm cho gà, vịt mổ lông, mổ mào nhau...

1. Nguyên nhân

- Do thời tiết nắng nóng bất thường.
- Do mùi hôi chuồng trại, tồn lưu nhiều khí độc (NH_3 , H_2S), chuồng trại kém vệ sinh.
- Do điều kiện chuồng nuôi không thông thoáng, ánh sáng quá mạnh hoặc quá tối.
- Do mật độ chuồng nuôi quá dày không đảm bảo.
- Do rối loạn hấp thu dinh dưỡng đặc biệt là các chất khoáng.
- Do mất cân bằng dinh dưỡng giữa các nhóm dinh dưỡng: Khoáng, đạm,...

2. Cách khắc phục

Khi bà con thấy xuất hiện trong đàn vật nuôi của gia đình (gà, vịt) có hiện tượng cắn mổ nhau cần thực hiện một số biện pháp đồng thời sau:

- Theo dõi và bắt tách ngay con gà, vịt hay đi mổ nhốt riêng và cắt mổ của nó.
- Những con gà bị mổ có vết thương hở và bị chảy máu phải được cách ly đồng thời sử dụng thuốc sát trùng Xanh Methylen hoặc CN-AKH để bôi lên vết thương.
- Điều tiết giảm cường độ ánh sáng, tạo điều kiện thông thoáng cho chuồng nuôi.
- Sử dụng mọi biện pháp để giảm mùi hôi chuồng trại, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
- Kiểm tra và cung cấp đủ nước cho gà, vịt uống. Cho gà, vịt ăn ít một chia làm nhiều lần trong ngày và tuyệt đối không để gà thiếu nước.
- Khẩn trương bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu và cân bằng chúng cho phù hợp: Vitamin-chất xơ và khoáng vi lượng đặc biệt là Ca và Fe (Thuốc Doxyvit Thái, Super Vitamin; Embrio-stimulan)
- Ngoài ra cần sử dụng thường xuyên chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái cho gà, vịt ăn hoặc uống theo cách sau: Dùng 5ml chế phẩm sinh học Vườn Sinh Thái pha với 10 – 12 lít nước cho gà, vịt uống hoặc cho ăn (1ml pha với 2kg cám hỗn hợp viên). Cho ăn hoặc uống 2 ngày một lần vào buổi chiều mát. Lưu ý lượng chế phẩm Vườn Sinh Thái pha trộn với 50 – 60% khẩu phần ăn, uống là phù hợp.