

Cách trị bệnh phù đầu lợn

1. Biểu hiện bên ngoài:

- Đối tượng bị bệnh: Chủ yếu lợn sau cai sữa.
- Những con lợn tonhắt trong đàn, phát bệnh trước và chết đột ngột.
- Trước khi chết, hàm cứng, co giật, thần kinh rối loạn, dáng đi lảo đảo, xiêu vẹo, hay vấp ngã, lợn kêu ré lên với giọng khàn hoặc thích nằm một chỗ, thân nhiệt không tăng hoặc tăng ít. Đầu, mắt sưng to, mắt híp. Bà con nông dân thường gọi là bệnh phù mắt.

2. Phòng bệnh:

- Cho uống kháng thể của Hanvet (HANVET –KTE Hi) ngay sau khi sinh, liều 1ml/con.
- Giảm thức ăn tinh, tăng thức ăn xơ.
- Dùng vắc xin E.coli phù đầu của Viện Thú y Quốc gia (chai 20ml, liều 1ml/con).

3. Trị bệnh:

- Khi phát hiện thấy lợn có triệu chứng của bệnh phải cho nhịn ăn từ 12-24 giờ. Ngày hôm sau cho 1/2 khẩu phần, chia làm nhiều bữa trong ngày. Sau 2-3 ngày tăng dần lượng thức ăn, tới ngày thứ 6 mới cho ăn tự do.
- Cung cấp nước và các chất điện giải (Hanminvit-Super, Hanvit K&C) để duy trì tuần hoàn, huyết áp.
- Dùng kháng thể điều trị (HANVET –K.T.E) tiêm xoang bụng hay cho uống.
- Sử dụng một số kháng sinh điều trị như Colivilavet, Gentacosmis dạng gói hoặc Enrofloxacin, Norfloxacin...
- Khử trùng tẩy uế chuồng trại trong thời gian điều trị./.