

Bọ xít dài hại lúa và biện pháp phòng trừ

□

Bọ xít dài (*Leptocorisa varicornis*) thường gọi là bọ xít hôi gây hại nhiều ở các tỉnh miền núi. Hàng năm bọ xít phá hại mạnh nhất vào tháng 5, 6, và 9, 10 trên cả lúa xuân và lúa mùa. Bọ xít non và trưởng thành chích hút trên bông lúa, đặc biệt khi lúa ở giai đoạn trổ □ chín sấp nêu hại nặng sẽ làm cho hạt lúa bị lép và thâm đen làm giảm phẩm chất gạo, gạo dễ gãy và có vị đắng.

1. Đặc điểm của bọ xít dài

Bọ xít trưởng thành có màu xanh vàng hơi pha màu nâu, cánh màu nâu vàng, mình thon mảnh, chân và râu dài, có mùi hôi □ Bọ xít non hình dạng giống trưởng thành, đuôi nhọn, màu xanh lá mạ, không có cánh. Trứng nhìn phía trên xuống có hình bầu dục, màu vàng nâu hoặc nâu hạt chè.

Bọ xít trưởng thành thường hoạt động vào sáng sớm và chiều mát. Sau khi mưa, trời hừng nắng hoạt động mạnh, khi nắng to bọ xít bay vào các bụi cây quanh ruộng trú ẩn. Trứng của bọ xít thường được đẻ thành ổ 2 hàng, trên cả 2 mặt lá lúa đa số ở mặt trên và ngoài mép lá, có khi đẻ trên bẹ lá. Trứng mới đẻ có màu trắng đục. Khi sắp nở có màu vàng nâu hoặc nâu đậm hơn, có vết nhăn và lõm ở giữa.

Bọ xít non sau khi nở ra tập trung quanh ổ trứng, sau 2-3 tiếng thì phân tán lên bông lúa hoặc lá lúa để chích hút nhựa. Bọ xít non có 5 tuổi.

2. Biện pháp phòng trừ

Để chủ động phòng trừ sự phát sinh gây hại bọ xít dài hại lúa bà con thực hiện theo các hướng dẫn sau:

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại, phát quang bụi cây quanh ruộng.
- Tập trung cấy gọn đúng thời vụ để có kế hoạch theo dõi, chủ động tổ chức phòng trừ. Có thể gieo cấy sớm một số diện tích để lúa trổ sớm, như bọ xít rồi tiêu diệt.
- Sử dụng các bó lá xoan ngâm nước giải 1 ngày, cắm lên các cọc cao 0,6-0,8 m bố trí quanh ruộng để tập trung tiêu diệt.

- Biện pháp hóa học:

□ Phun trừ đối với những ruộng có mật độ bọ xít 6 con/m². Sử dụng một trong các loại thuốc sau □ Regent 800WG, Fastac 5EC, Ofatox 400EC, Watox 400EC...

- Khi phun cần tiến hành phun xung quanh bao vây, sau đó phun vào trong theo hình xoắn ốc □

Bảng hướng dẫn sử dụng một số thuốc trừ bọ xít dài

□

□ TT	□ Tên hoạt chất □ (Tên thuốc) □	□ Liều lượng
1	□ Hoạt chất Alpha cypermethrin (Fastac 5EC, ...)	Pha 6-8ml/bình 8 lít, phun 2 bình/sào

2	<input type="checkbox"/> Hoạt chất Fenitrothion + Trichlorfon <input type="checkbox"/> (Ofatox 400EC,...)	Pha: 20-25ml / bình 8-10 lít nước phun 2 bình/sào
3	<input type="checkbox"/> Hoạt chất Fipronil <input type="checkbox"/> (Regent 800WG,...)	Pha 1g/ bình 10 lít, phun 1-2 bình sào
4	<input type="checkbox"/> Hoạt chất Dimethoate (Watox 400EC,...)	Pha 30-40ml/ bình 15-20 lít, phun cho 1 sào <input type="checkbox"/>

Lưu ý: Tiến hành phun thuốc từ ngoài vào trong cho đến giữa ruộng; Sử dụng bảo hộ lao động khi phun thuốc.