

## **Kỹ thuật cho Lươn sinh sản**

### **1. Nuôi vỗ**

Thả khoảng 50 – 60 con lươn đồng cỡ 30 – 40cm bể/6m<sup>2</sup>. Cần thả lươn trong mùa sinh sản, sau đó tiến hành nuôi vỗ để cho sinh sản nhân tạo. Nên bố trí nuôi vỗ trong bể sử dụng giá thể là dây nylon để thuận tiện cho việc kiểm tra đánh giá mức độ thành thực của lươn và lựa chọn đực cái để tiến hành tiêm kích dục tố cho sinh sản. Cho lươn ăn ngày 1 lần với các loại thức ăn như: trùn quế, tép, ốc, cá băm nhỏ, dòi... Mỗi lần cho lươn ăn khoảng 300 – 500g. Mỗi tuần thay nước một lần (nên rút cạn hàng ngày). Hoặc tùy theo chất lượng nước của bể mà thay cho phù hợp.

### **2. Tiêm kích dục tố và bố trí sinh sản**

Định kỳ kiểm tra và lựa chọn các cá thể thành thực tốt tiến hành tiêm kích dục tố và bố trí điều kiện cho sinh sản. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy sử dụng kích thích tố HCG với 3 liều dẫn 300UI/kg và liều quyết định 2.000UI/kg đều có tác dụng kích thích sinh sản đối với lươn đồng.

### **3. Ương lươn đồng**

Trứng lươn thường nằm lẫn trong các đám bọt, nên khi phát hiện các đám bọt cần vớt trứng ra và tiến hành ấp. Ở nhiệt độ trung bình 30 độ C sau 1 tuần ấp trứng lươn sẽ nở. Sau khi nở lươn vẫn còn mang khối noãn hoàng rất to, sau 1 tuần khối noãn hoàng mới tiêu biến, lúc này ta bắt đầu cho lươn ăn. Thức ăn ban đầu thường sử dụng là trùn chỉ. Sau khi ương 1 – 1,5 tháng ta có thể tập cho lươn ăn dần các loại thức ăn như tép, cá... cho đến khi lươn đã quen với các loại thức ăn kể trên, thì có thể chuyển sang nuôi lươn thương phẩm.