

Kỹ thuật nuôi cá Bống Tượng

1. Chọn địa điểm nuôi

- Nguồn nước sạch, chủ động cấp và thay nước.
- Không bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, hóa chất từ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp.
- Đất không bị nhiễm phèn nặng.
- Tiện chăm sóc và quản lý.
- Diện tích nuôi thích hợp 200 – 500 m².

2. Chuẩn bị ao nuôi

- Ao được tát cạn, sên vét bùn đáy ao, lấp các lỗ mọt.
- Ao được phơi khô và bón vôi với liều lượng 7 – 10kg/100m².
- Dùng bột đậu nành 1kg/100m², DAP 1kg/100m² nhằm gây màu nước, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá.

3. Chọn giống và thả giống

3.1. Chọn giống

- Kích cỡ đồng đều, khỏe mạnh.
- Kích cỡ con giống thả tốt nhất: 80-100g/con hoặc 160-200g/con.
- Đuôi xoè rộng, các tia vây còn nguyên vẹn, nhiều nhớt, mang phồng to, không bị xây xát.
- Hiện nay có thể mua giống từ hai nguồn: từ các cơ sở sản xuất giống và tự nhiên qua các điểm thu gom. Đặc tính của hai nguồn giống như sau:

Giống tự nhiên	Giống nhân tạo
- Số lượng hạn chế nên thời gian thả kéo dài	- Cung cấp đủ giống với số lượng lớn một lần
- Cá lớn nhưng kích cỡ không đều, cá dễ bị phân đàn	- Cá nhỏ nhưng kích cỡ đều hơn
- Cá dễ bị xây xát do đánh bắt	- Cá ít bị xây xát
- Giá rẻ	- Giá thành cao

3.2 Thả giống

- Mật độ thả thích hợp 2con/m².
- Thả giống: vận chuyển giống vào lúc sáng sớm và trời mát, trước khi thả vào phải ngâm bao trong nước 15 phút để tránh sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ giữa bao đựng cá và môi trường nước ao nuôi. Trước khi thả cá được tắm bằng nước muối 3-5% trong 5-10 phút.

4. Chăm sóc quản lý

- Phân cỡ: cá thả nuôi tốt nhất phải đồng cỡ.
- Cho cá ăn thức ăn tươi sống như tôm, tép, cá nhỏ, trùng đất, ... Thức ăn đảm bảo còn tươi sống, được cắt nhỏ, vừa miệng cá, bỏ ruột, vây, đầu và được rửa sạch.
- Lượng thức ăn hằng ngày bằng 3 – 5% trọng lượng đàn cá. Cho ăn vào buổi chiều mát là chủ yếu. Nên bố trí sàn ăn để kiểm tra lượng thức ăn thừa hay thiếu, trung bình 2 sàn ăn cho 100 m². Ngoài ra, sàn ăn còn dùng để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá.
- Định kỳ thay nước 2 lần/tháng để đảm bảo chất lượng nước tốt, mỗi lần thay 20 – 30% lượng nước trong ao.
- Trong quá trình nuôi có thể định kỳ sử dụng chế phẩm sinh học để làm sạch môi trường.
- Thường xuyên theo dõi biến động của môi trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Thu hoạch

- Sau 9 – 10 tháng nuôi, cá đạt kích cỡ 400 – 600g/con thì tiến hành thu hoạch toàn bộ. Cá thường có kích cỡ không đều vì vậy những con chưa đủ kích cỡ có thể nuôi tiếp cho đến khi cá đạt kích cỡ thương phẩm.
- Cá bống tượng nuôi trong ao đất thường chui rúc vào đáy bùn có khi đến 1m, khó bắt. Cần tát cạn vào chiều mát, mò bắt sơ bộ, sau đó dùng chuỗi cây trang ao cho bằng, cho nước vào 5cm, nửa đêm và gần sáng cá bống tượng ngoi lên trên mặt bùn dùng đèn soi bắt. Có nơi còn dùng dòng nước chảy bắt cá vào đêm.