

## **Biện pháp chăm sóc ngô đông sau trồng**

### **1. Chủ động tưới, tiêu nước**

Trong thời gian này, thời tiết diễn biến khá bất thường có thể còn mưa nhiều, mưa lớn vẫn có thể xảy ra gây nên ngập úng, do đó trong ruộng cần phải có rãnh thoát nước ra kênh mương để khi có mưa lớn nước được tiêu thoát nhanh.

### **2. Cẩn chăm bón sớm**

Đặc biệt từ khi cây con đến khi ngô 5-6 lá, giai đoạn này rất quan trọng để ngô phát triển nhanh, không bị huyết dụ, chân chì. Sau trồng cần tưới đủ ẩm để ngô bén rễ nhanh, có thể sử dụng Super lân pha loãng để tưới bổ sung dinh dưỡng cho cây, ngô không chịu được ngập úng, đặc biệt giai đoạn cây con, do vậy không để đọng nước trên mặt luống ngô.

### **3. Bón phân thúc**

- Bón thúc lần 1: Khi cây có 3 - 5 lá, bón 3-4 kg đạm Urê + 3 kg KaliClorua. Để tránh bị xót phân, nên bón phân vào giữa 2 cây, cách gốc từ 10 - 12 cm (nếu đất đủ ẩm), bón xong kết hợp với làm cỏ và vun gốc. Tốt nhất hoà nước tưới để phân ngấm đều rễ hấp thụ nhanh nhất.

- Bón thúc lần 2: Khi cây 7 - 9 lá bón 3-4 kg đạm Urê + 4 kg Kaliclorua (kỹ thuật bón như lần 1). Có thể vét sâu rãnh để vun cao luống giúp ngô ra nhiều rễ chân kiềng tăng khả năng chống đổ cho cây.

- Nếu sử dụng phân bón NPK 12:5:10 để bón thúc cần bón với lượng 9 - 10 kg/sào cho mỗi lần bón thúc, bón phân xung quanh xa gốc 10 - 15cm. Bón phân khi đất ẩm và phải lấy đất, bùn ướt lấp kín phân, sau khi bón kết hợp là sạch cỏ dại.

Thời điểm này, trên đồng ruộng vẫn còn tồn tại Châu chấu, tàn dư nấm bệnh (khô vằn, đạo ôn...) do lúa mùa đã thu hoạch hết nên mối nguy hại lên cây ngô là rất cao. Vì vậy, việc kiểm tra thăm đồng thường xuyên là rất cần thiết để phát hiện sớm có biện pháp phòng trừ kịp thời, bảo vệ cho cây ngô sinh trưởng phát triển tốt ngay ở thời kỳ đầu.