

## Hướng dẫn cách phối trộn thức ăn cho lợn con

Khi lợn con bị mất mẹ hoặc mất sữa nếu không biết cách chăm sóc thì đàn lợn có thể chết hàng loạt, vì vậy cần chú ý các biện pháp chăm sóc để lợn khỏe mạnh.

### 1. Giai đoạn đầu 7 - 10 ngày tuổi:

Dùng sữa bột tốt 97%, mật ong 2% và 1% Premix khoáng sinh tố. Tất cả trộn đều cho ăn 25 - 40 g/con (tùy theo giống lợn) với 150cc nước ấm đun sôi. Cho ăn mỗi ngày 6 bữa vào lúc 6, 9, 12, 15, 18, 21 giờ trong ngày. Trong 2 ngày đầu, lợn con chưa quen có thể dùng găng tay (tránh sờ trực tiếp bàn tay vào lợn) bắt từng con, lấy lông gà sạch quét hỗn hợp thức ăn này vào miệng lợn con. Sang ngày thứ 4 cho ăn bằng thìa. Khi bón hạ dần thìa xuống đĩa để lợn con liếm láp và sau đó tự liếm trên đĩa. Chỉ cần huấn luyện vài con biết ăn, những con khác sẽ bắt chước. Nếu lượng lợn con nhiều có thể cho ăn bằng máng nông rộng hơn.

### 2. Giai đoạn 11 - 20 ngày

Lấy 1/3 sữa bột đóng túi trộn với 2/3 bột mì trộn đều hoà với nước nấu chín, để nguội trộn với 1% Premix khoáng sinh tố (hoặc thay bằng 100 - 200 g rau xanh non thái nhỏ và 0,5% bột khoáng). Giai đoạn này mỗi con cho ăn 110 - 250 g hỗn hợp chia làm 5 bữa vào 6, 10, 14, 18, 20 giờ trong ngày.

### 3. Giai đoạn từ 40 - 60 ngày

Nơi nào có yêu cầu nuôi lợn con có khối lượng lớn hơn thì nuôi tiếp đến 60 ngày. Dùng cám gạo loại 1 (bỏ trấu bỏi) 58% + 8% bột đỗ tương + 4% bột cá nhạt trộn đều, nấu chín dạng lỏng sệt, để nguội bớt, rồi trộn với 1% Premix khoáng sinh tố hoặc thay bằng 10% bột ngô, bồng rươi. Cho ăn hỗn hợp này trên mỗi con 200 - 350 g/ngày, chia làm 4 - 5 bữa/ngày. Ngoài ra có thể dùng 45% cám gạo tốt + 30% bột ngô nấu thật nhừ để nguội rồi trộn với 25% thức ăn đậm đặc dành cho lợn con tập ăn của các hãng Proconco, Higo CP... để nuôi lợn con giai đoạn này.

### 4. Phòng trị bệnh

- Nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Sau mỗi bữa ăn rửa máng sạch sẽ.

- Khi cho đàn lợn ăn, quan sát phát hiện những con ăn kém, chậm chạp để kịp thời bắt nhốt riêng theo dõi chữa trị và bồi dưỡng tốt hơn.

- Tiêm phòng: 20 ngày tiêm vắc xin dịch tả, 25 ngày tiêm vắc xin đóng dấu - tụ huyết trùng, 30 ngày tẩy giun sán, 35 ngày tiêm nhắc lại vaccin dịch tả.

<http://nguoichannuoi.vn/cach-phan-tron-thuc-an-cho-lon-con-fm287.html>