

Phòng trị bệnh viêm khớp trên lợn con

Bệnh viêm khớp trên lợncon là một trong những nguyên nhân chính gây chết lợntrước khi cai sữa. Những lợncon khỏi bệnh sẽ bị dị tật và có dáng đi khập khiễng, ảnh hưởng đến khả năng ăn uống, giảm hấp thu, chậm lớn, làm tăng tiêu tốn thức ăn.

1. Nguyên nhân gây bệnh

Do các vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể lợnđường miệng, cuống rốn, vết thương khi cắt đuôi, bấm răng, bấm tai, các vết thương trên chân, da, đầu gối khi chúng chà sát trên nền chuồng cứng, thô ráp hoặc qua vết thối. Một nguyên nhân khác là do lợncon sau khi sinh không được bú sữa đầu từ lợnmẹ đầy đủ, nhất là ở những lợnbị mất mẹ...

2. Triệu chứng của bệnh viêm khớp trên lợncon

Thấy chúng đi khập khiễng từ 3-4 ngày tuổi. Khớp chân sưng lên sau đó 7-15 ngày tuổi và heo có thể chết sau đó lúc 2-5 tuần tuổi. Dấu hiệu viêm có thể thấy trên mọi ổ khớp nhưng thường thấy nhất là khớp cổ chân, khớp háng và khớp bàn chân. Khi rạch ổ khớp viêm thấy trong khớp có mủ đặc, có vết máu và những chất hoại tử màu trắng.

3. Điều trị bệnh viêm khớp

Có thể sử dụng các chất kháng sinh tổng hợp như Ampicilin, Penicillin phối hợp Streptomycin... để tiêm trực tiếp vào khớp viêm và chích bắp thịt để điều trị toàn thân. Cần điều trị thật sớm ngay sau khi phát hiện ra triệu chứng viêm khớp.

4. Phòng bệnh viêm khớp cho lợncon

Cần vệ sinh sát trùng chuồng đẻ kỹ lưỡng. Dùng thuốc sát trùng hoặc đun sôi các dụng cụ đỡ đẻ, kèm bấm răng, cắt đuôi, thối lợnđực... Nền chuồng nuôi lợncon không quá thô nhám, gồ ghề để tránh các vết trầy da cho lợncon khi chúng tranh bú mẹ. Sau khi cắt cột cuống rốn cần sát trùng đầu rốn bằng cồn Iod. Cần chăm sóc, bảo đảm cho các lợncon sau khi sinh được cho bú sữa đầu đầy đủ.

<http://nguoichannuoi.vn/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html>