

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi lợn nái mang thai

Chế độ nuôi dưỡng lợn nái sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ thai, số lợn con sơ sinh, khối lượng và sức sống của lợn con, thể trạng của lợn mẹ, khả năng tiết sữa, khả năng động dục trở lại và thời gian sử dụng lợn mẹ.

1. Nhận biết lợn mang thai (nái chữa)

Để giúp người chăn nuôi heo có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp, đảm bảo thai phát triển bình thường và lợn mẹ khỏe, tránh tình trạng bệnh lý cho lợn mẹ và bào thai, cần phải xác định lợn nái chữa.

Trước khi nhận biết lợn nái có thai hay không cần kiểm tra rõ một số thông tin sau:

- Thời gian phối giống cho lợn lần cuối cùng, số lần phối.
- Sau khi phối giống lợn có động dục lại không.
- Lợn có bệnh về đường sinh dục không.
- Tình hình nuôi dưỡng lợn nái.

Cách nhận biết lợn chữa

Lợn đã có chữa thường nằm sấp, thường xuất hiện trạng thái phù thũng ở tứ chi, thành bụng. Tuyến vú phát triển to lên, bè ra. Lợn yên tĩnh ăn uống tốt và ngủ ngon, bụng phát triển to lên. Lợn không có biểu hiện động dục lại sau 21 ngày kể từ lúc phối.

2. Nuôi dưỡng lợn nái chữa

Chế độ nuôi dưỡng lợn nái sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ thai, số lợn con sơ sinh, khối lượng và sức sống của lợn con, thể trạng của lợn mẹ, khả năng tiết sữa, khả năng động dục trở lại và thời gian sử dụng lợn mẹ.

- Chế độ cho ăn:

Mức ăn cho lợn nái chữa

Giống lợn/Trọng lượng lợn nái (kg)	Thức ăn/nái/ngày (kg) theo từng giai đoạn chữa của lợn (ngày)			Số bữa ăn/ngày
	01 – 84 ngày	85 – 110 ngày	111 – 114 ngày	
Giống nội				
50 – 65	1 – 1,2	1,4 – 1,5	0,8 – 1,0	2
65 – 85	1,2 – 1,3	1,5 – 1,7	1 – 1,2	2
Giống lai F1				
80 – 100	1,3 – 1,4	1,5 – 1,7	1 – 1,2	2
100 – 120	1,4 – 1,5	1,7 – 1,9	1,1 – 1,3	2
120 – 140	1,5 – 1,8	1,9 – 2,2	1,2 – 1,4	2
140 – 160	1,8 – 2,0	2,2 – 2,5	1,3 – 1,5	2

Lợn ngoại				
> 130	2 – 2,4	2,5 – 2,8	1,4 – 1,6	2

*** Thức ăn và cách cho ăn**

- Thức ăn đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, không bị ôi thiu, mốc. Cho lợn nái ăn các thức ăn bị mốc sẽ dễ gây tiêu thai, thai gổ, sảy thai hoặc lợn con đẻ ra yếu ớt. Cho ăn đúng giờ để kích thích tính thèm ăn, khi thay đổi thức ăn phải thay đổi từ từ.

- Cung cấp đủ nước sạch cho lợn uống.

- Mức ăn trong một ngày của lợn nái chữa còn phụ thuộc vào thể trạng của lợn nái (gầy, béo hay bình thường). Lợn nái gầy phải cho ăn tăng, lợn nái quá béo phải giảm thức ăn đã phối trộn nhưng lại tăng thức ăn thô xanh.


- Vào mùa đông, khi nhiệt độ trong chuồng nuôi dưới 15 độ C, lợn nái cần được ăn tăng thêm (0,2 – 0,3 kg thức ăn/nái/ngày) để bù vào phần năng lượng mất đi do phải chống lạnh.

3. Chăm sóc lợn nái chữa

Đảm bảo chế độ vận động cho lợn nhưng yên tĩnh và không xáo trộn đàn. Chuồng trại thoáng mát, duy trì nhiệt độ 26 – 28 độ C là tốt nhất.

Vệ sinh phòng bệnh: Thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống và chuồng trại. Tiêm phòng cho lợn nái chữa trước thời gian dự kiến đẻ 15 ngày theo đúng qui định thú y. Có sổ và ghi đầy đủ tình trạng sức khỏe, lượng thức ăn và vắc xin phòng bệnh. Trước khi đẻ 7 – 10 ngày cần vệ sinh và xoa bóp bầu vú cho lợn nái 1 – 2 lần/ngày để kích thích thông tia sữa.

NÁI HẬU BỊ – CHỮA LỬA 1



Ghi chú: Vắc xin Farrowsure: phòng bệnh pavovirus, đóng dấu lợn, bệnh xoắn khuẩn (Leptospira). Ở những vùng có bệnh tai xanh, cần tiêm vắc xin tai xanh cho lợn nái trước khi phối giống, 4 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.

4. Một số chú ý

Không cho lợn nái chữa ăn quá nhiều vì lợn nái béo sẽ dẫn đến: Khó đẻ; Có thể đẻ chết con; Tiết sữa kém.

Không để lợn nái chữa ăn quá ít, lợn sẽ bị gầy dẫn đến: Dễ mắc bệnh; Thiếu sữa nuôi con; Lợn nái hao mòn nhiều trong giai đoạn nuôi con và sẽ lâu động dục trở lại sau khi cai sữa lợn con.

Đảm bảo đủ vitamin và chất khoáng trong khẩu phần ăn

Vitamin rất quan trọng cho sự phát triển của bào thai. Thiếu vitamin lợn con sẽ phát triển chậm, sức sống kém, dễ chết yểu.

Chất khoáng rất quan trọng cho bào thai và lợn nái. Thiếu chất khoáng, xương lợn con kém phát triển, lợn nái chữa có nguy cơ bị bại liệt hai chân sau.

Một số loại thức ăn không nên dùng cho lợn nái chữa:

- Bông bã rượu tốt cho lợn thịt, nhưng không tốt cho lợn nái. Nếu ăn nhiều sẽ gây kích thích sảy thai.
- Khô dầu bông có thể gây chết thai.
- Lá đu đủ tốt với nái nuôi con nhưng không tốt cho lợn nái chữa vì làm giảm nhịp đập của tim gây khả năng nuôi thai kém.

TS. Nguyễn Thị Liên Hương

<http://nguoichannuoi.vn/huong-dan-ky-thuat-nuoi-lon-nai-mang-thai-fm921.html>