

Phòng trị bệnh giả dại ở lợn

Bệnh giả dại hay còn gọi là bệnh Aujeszky do virus thuộc nhóm herpes gây ra, tấn công vào hệ thần kinh trung ương và các cơ quan khác như hệ hô hấp, sinh sản của lợn. Lợn là ký chủ tự nhiên chủ yếu nhưng virus cũng có thể lây nhiễm cho chó, mèo và trâu bò gây ra các triệu chứng thần kinh trầm trọng và chết.

1. Triệu chứng

- Thể cấp tính: Virus bệnh giả dại khi xâm nhập vào đàn lợn cảm thụ sẽ gây ra một ổ dịch cấp tính mà dấu hiệu ban đầu là sốt, bỏ ăn, lơ đãng và tùy lợn từng lứa tuổi mà lợn có các triệu chứng lâm sàng khác nhau.

- Lợn nái: Ở lợn nái dấu hiệu ban đầu thường là một vài con bị sảy thai. Lợn nái bị nhiễm virus vào đầu thai kỳ có thể bị lên giống trở lại do thai chết và bị hấp thụ. Nếu bị nhiễm vào giữa thai kỳ thì có thể bị sảy thai và sinh ra thai khô, còn nhiễm vào giai đoạn cuối thì sẽ bị sảy thai, lợn con chết non hoặc ốm yếu, còi cọc, run rẩy.

- Lợn con lợn mẹ: Dấu hiệu đầu tiên ở lợn con mới sinh là tình trạng lơ đãng, xù lông, sau đó chúng bỏ bú và trong vòng 24 giờ xuất hiện các triệu chứng như: run rẩy, đi loạng choạng, ho, chảy nước miếng, nước mũi lòng rờng và lên cơn co giật, mất đảo lòng vòng và có thể bị nôn ói hoặc tiêu chảy. Một số con có các dấu hiệu lâm sàng như đi lòng vòng, ngồi như chó ngồi hoặc nằm nghiêng và bơi chèo. Lợn con chết trong vòng 24 – 36 giờ sau khi các dấu hiệu thần kinh bắt đầu xuất hiện. Tỷ lệ chết ở lợn con rất cao có thể đến 100%.

- Lợn cai sữa và lợn thịt: Lợn cai sữa cũng có các triệu chứng tương tự như lợn con lợn mẹ nhưng nhẹ hơn. Ban đầu lợn bị sốt cao 41 – 42°C, hắt hơi, chảy nước mũi, ho, khó thở và một số con có các triệu chứng thần kinh hoặc bị viêm phổi nặng và chết, tuy nhiên tỷ lệ chết thường dưới 10%. Phần lớn lợn hồi phục hoàn toàn sau 5 – 10 ngày tuy nhiên có thể có một số con bị còi cọc và chậm lớn.

- Thể bệnh mãn tính và tình trạng mang trùng: Ở thể mãn tính, virus bệnh giả dại lưu hành trong đàn lợn có thể không gây ra các dấu hiệu lâm sàng nhưng có khuynh hướng làm bộc phát bệnh viêm phổi địa phương do *Mycoplasma hyopneumoniae* và lợn dễ bị nhiễm các vi trùng như *Pasteurella multocida* gây bệnh tụ huyết trùng và *Actinobacillus pleuropneumoniae* gây viêm phổi. Những con lợn khỏi bệnh có thể trở thành những con mang trùng, có virus tiềm ẩn trong cơ thể, làm lây lan virus cho các con lợn khác và truyền virus cho lợn con qua dạ con hoặc sau khi sinh.

2. Bệnh tích

Nói chung thường không thấy được bệnh tích đại thể đặc trưng trên lợn mắc bệnh giả dại. Ở lợn con chủ yếu dưới 7 ngày tuổi có thể có các đốm hoại tử nhỏ màu trắng đục rải rác trên gan và lách. Phổi bị xung huyết hoặc phù, viêm hạch amidan, xuất huyết hạch lymphô phổi.

3. Chẩn đoán

Đối với ổ dịch thể cấp tính thì việc chẩn đoán bệnh giả dại chủ yếu dựa trên các dấu hiệu lâm sàng mô tả ở trên đặc biệt là ở trên lợn con mới sinh. Tuy nhiên trong trường hợp bệnh mãn tính thì có thể nhầm lẫn với Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) và Bệnh cúm lợn thể mãn tính. Trong phòng thí nghiệm, virus có thể được phát hiện bằng phương pháp kháng thể huỳnh quang hoặc phân lập virus trên tế bào. Phát hiện kháng thể bệnh giả dại bằng phương pháp ELISA.

4. Điều trị và phòng bệnh

Cách tốt nhất để phòng bệnh giả dại là chủng vacxin cho lợn kết hợp với quản lý an toàn sinh học thật tốt cho cơ sở chăn nuôi. Bệnh giả dại do virus gây ra nên không thể điều trị được, tuy nhiên nên sử dụng kháng sinh để kìm chế các vi trùng phụ nhiễm trên lợn. Công ty Navetco có các sản phẩm có thể điều trị vi khuẩn kế phát trong bệnh giả dại kết hợp với Navet-Interferon để kìm chế sự nhân lên của virus giúp cho bệnh giảm nhẹ và rút ngắn thời gian bệnh....

<http://nguoichannuoi.vn/benh-gia-dai-o-lon-fm517.html>