

## Phòng trị bệnh viêm ruột và nhiễm độc tố ruột xuất huyết ở lợn

Nghiên cứu nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng bệnh viêm ruột xuất huyết ở lợn.

### 1. Giới thiệu chung

Bệnh viêm ruột và nhiễm độc tố ruột xuất huyết ở lợn thường xảy ra ở lợn con lợn mẹ như là một hội chứng. Do vi khuẩn *Clostridium perfringens* (type C). Gây bệnh trên lợn con còn bú, làm lợn con viêm ruột tiêu chảy nặng và chết. Bệnh thường xuất hiện ở lợn con từ 5 ngày tuổi đến khi cai sữa.

### 2. Nguyên nhân gây bệnh

Do vi khuẩn *Clostridium perfringens* (type C). Bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hoá như: thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, sữa mẹ... Bình thường *Clostridium perfringens* hiện diện ở các cơ quan tiêu hoá của tất cả các lợn con trước khi cai sữa. Nếu chăm sóc nuôi dưỡng không tốt, yếu tố ngoại cảnh xấu, sức đề kháng của lợn con yếu vì thể lợn con dễ phát bệnh.

### 3. Triệu chứng lâm sàng

- Thể cực cấp tính: xảy ra rất nhanh trong vòng 8 giờ đầu tiên sau khi sinh, lợn con trở nên yếu ớt dần dần rồi chết và lợn con cũng dễ bị mẹ đè. Thường không biểu hiện triệu chứng gì bên ngoài, có khi thấy tiêu chảy ra máu.

- Thể cấp tính: thường thấy trên lợn con khoảng 2 – 5 ngày tuổi. Dấu hiệu đầu tiên là chết bất thành linh và kèm lợn tiêu chảy ra máu, bệnh xảy ra rất nhanh, lợn chết nhanh sau khi tiêu chảy ra máu.

- Thể bán cấp tính: Lợn con đi ỉa phân thường có màu nâu đỏ có chứa những mảng hoại tử, lợn con trở nên yếu dần rồi chết sau 2 – 3 ngày mắc bệnh.

### 4. Bệnh tích

- Cả hệ thống tiêu hoá ở lợn con xung huyết và xuất huyết.

- Lợn con gầy còm, yếu ớt rõ rệt trước khi chết.

- Thể cấp tính nhẹ và á cấp tính thường ruột viêm xuất huyết, sưng to và trở nên dày làm ruột căng phồng.

- Khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng khó có thể chữa khỏi, do đó cần có biện pháp phòng bệnh là tốt nhất.

### 5. Phòng bệnh

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại, vật nuôi.

- Dùng các loại kháng sinh trộn vào thức ăn cho lợn ngừa bệnh.

- Thường xuyên bổ sung vào thức ăn đầy đủ dưỡng chất cần thiết giúp lợn khoẻ mạnh, có sức đề kháng tốt.

- Cho lợn ăn thường xuyên nhằm tăng cường hệ thống miễn dịch giúp lợn có khả năng chống lại các tác nhân stress.

## 6. Điều trị

Một số loại kháng sinh được lựa chọn để điều trị bệnh do Clostridium perfringens gây ra như: Penicilline, Amoxicillin, Cefotiofur, Cephalosporin, Bacitracilin. Cùng với việc sử dụng kháng sinh cần đảm bảo cân bằng chất điện giải kết hợp với hộ lý chăm sóc tốt.

- Phác đồ 1: Tiêm LEXIN 750 với liều 1ml/ 6 – 8 kg TT kết hợp ĐIỆN GIẢI GLUCO – K – C – HDH với liều 2g/ 1 lít nước uống hoặc 100g/ 40 kg thức ăn, kết hợp MEN SỐNG HDH với liều 1g/ 5 – 7 kg TT.

- Phác đồ 2: Tiêm ENROFLOHEN với liều 1ml/ 4 – 7 kg TT/ ngày kết hợp ĐIỆN GIẢI GLUCO – K – C – HDH với liều 2g/ 1 lít nước uống hoặc 100g/ 40 kg thức ăn, kết hợp LACTO – C – HDH với liều 1g/ 8 – 10 kg TT/ ngày.

- Phác đồ 3: Tiêm E.COLI VIÊM với liều 1ml/ 6 – 9 kg TT/ 3 – 5 ngày kết hợp với ĐIỆN GIẢI – K – C – VIT hoà nước uống hoặc trộn thức ăn với liều 1 – 3g/ lít/ 3 – 5 ngày.

<http://nguoichannuoi.vn/benh-viem-ruot-va-nhiem-doc-to-ruot-xuat-huyet-olon-fm609.html>