

Biện pháp giúp tăng lượng sữa ở lợn nái

Để lợn con phát triển tốt thì cần rất nhiều sữa, lượng sữa mẹ sau khi sinh đến khoảng 3 tuần sẽ đạt mức cao nhất, sau đó sẽ từ từ giảm dần chính vì vậy lợn con khi đạt 3 tuần tuổi phải chuyển sang cho ăn cám.

1. Phải cho uống nhiều nước:

Nếu nuôi lợn nái bị thiếu nước thì sẽ giảm lượng cám ăn vào: Trong thời kì lợn nái nuôi con, tuy lượng nước lợn nái cần thay đổi theo từng thời kì nhưng tối thiểu một ngày phải cần 35 lít. Sau khi đẻ đến tuần thứ ba lượng sữa tiết ra nhiều nhất thì một ngày lợn nái cần tới 50 lít nước.

2. Lợn nái phải ăn nhiều cám:

Lượng nước, nhiệt độ chuồng và trạng thái sức khỏe của nái ảnh hưởng rất lớn đến lượng cám ăn vào thời kì lợn nái nuôi con.

3. Thành phần thức ăn của lợn nái phải phù hợp.

4. Luôn duy trì nái khỏe mạnh:

Những lợn nái đẻ bình thường, sau khi đẻ xong cần cho lợn nái ăn cám và uống nước nhằm sản xuất sữa và phục hồi lại năng lượng. Và phải duy trì phòng chống bệnh viêm vú cho lợn nái.

Khi lợn nái có dấu hiệu sanh thì phải quan sát lợn nái cẩn thận. Nếu thấy bất cứ triệu chứng bất thường nào cần cấp tốc điều trị để không ảnh hưởng tới quá trình tiết sữa sau này.



5. Lợn con phải khỏe mạnh:

Để lợn con khỏe mạnh nên nhanh chóng cho lợn con bú nhằm kích thích lợn nái tiết sữa ngay từ đầu. Cần phải chú ý quan tâm tới những lợn con quá nhỏ không bú được. Cần di chuyển những con lợn này tới các bầu vú nhiều sữa. Có trường hợp để duy trì khả năng tiết sữa cho lợn nái chúng ta có thể ghép bầu lợn con lớn vào lợn nái khác.

6. Nhiệt độ trong chuồng trại phải phù hợp:

Nếu nhiệt độ trong trại nuôi lợn quá cao là không được. Nhiệt độ thích hợp cho lợn nái là 20~22 độ hoặc thấp hơn nữa. Trường hợp lợn nái không ăn cám, trong máng còn nước đã bị dơ thì nguyên nhân có thể là do nhiệt độ trong trại cao hơn nhiệt độ thích hợp.

7. Phải giữ môi trường sạch sẽ và yên tĩnh cho lợn lợn nái:

Nhằm duy trì lượng sữa tiết ra cao nhất mọi hoạt động trong trại cần phải tránh gây tiếng động. Cần tạo cho lợn nái cảm giác an toàn với con người. Nếu tạo ra không khí bất an hoặc tiếng động lớn thì nái sẽ bị stress làm ảnh hưởng tới lượng sữa tiết ra. Hơn nữa tiếng ồn có thể làm giảm khả năng lợn nái nghe được những tiếng kêu của lợn con, điều này là không tốt

Thông thường lợn nái cho bú khoảng 40 phút một lần. Khi lợn nái cho con bú, lợn nái nằm nghiêng một bên, khoảng 10~20 giây sau lợn con đồng loạt đến bầu vú bú thì được.

8. Nái phải phát triển tuyến vú tốt:

Cần phải lựa chọn những lợn nái có tuyến vú phát triển tốt để không xảy ra tình trạng ghép bầu sau khi sinh 24 tiếng do lượng sữa thiếu.

9. Thiết bị chuồng trại phải phù hợp:

Độ dài khuyến cáo của chuồng nuôi lợn nái là 210 cm (khích thước lọt lòng), rộng 65 cm, phía sau khoảng 90 cm có thể điều chỉnh. Phải thiết kế sao cho khi lợn nái nằm xuống cho con bú, lợn con có thể tiếp cận các bầu vú dễ dàng.

Chú ý: Nếu lượng sữa tiết ra giảm nếu:

- Lợn con sẽ bị yếu
- Tỷ lệ chết tăng
- Trọng lượng cai sữa giảm
- Năng lực nái không được phát huy
- Cần nhiều nái để ghép bầu
- Các bệnh nguy hiểm trên lợn con tăng.

<http://nguoichannuoi.vn/tang-luong-sua-nai-tiet-ra-fm788.html>