Phòng trị bệnh viêm cơ trên bò sữa

1. Đặc điểm

Bệnh gây ra những khối to tại các vị trí như cơ bắp, cơ đùi, tạo thành bọc có mủ dẫn đến vùng cơ bị xơ (Áp-xe). Đây không phải là bệnh lây lan truyền nhiễm, nhưng có ảnh hưởng nhất định đến khả năng sản xuất trên bò sữa.

2. Nguyên nhân

Có hai nguyên nhân chính:

- Do tác động cơ học: là sự va chạm mạnh do bò bị hoảng sợ, chạy nhảy đụng vào gây tổn thương vùng cơ mà không được quan tâm điều trị tích cực.

- Do tác động hóa học: việc tiêm thuốc không đúng kỹ thuật, kim tiêm không đúng kích cỡ cho từng vị trí tiêm; hoặc do loại thuốc tiêm có chất nhủ dầu không hấp thu được vào máu, gây hiện tượng viêm cơ (áp-xe) tại vị trí tiêm thuốc.

3. Triệu chứng

Có hai dạng viêm cơ:

- Thể cấp tính: có hiện tượng sưng, nóng, đỏ, đau ngay ở vị trí bị viêm, bò giảm ăn, thân nhiệt tăng cao (39 – 40 độ C), năng suất sữa giảm nhẹ.

- Thể mãn tính: không có hiện tượng sưng, nóng, đỏ, đau nhưng tại vùng cơ bị viêm nổi cục u cứng. Nếu không được điều trị, khối u ngày càng phát triển to dần, vùng cơ tại chỗ viêm căng cứng, mất cảm giác.

4. Điều trị

a. Thể cấp tính:

- Dùng kháng sinh Amoxillin 20ml/con/ngày, liên tục trong 3 ngày.

- Dùng thuốc giảm đau, hạ sốt: Analgine + Vitamin C, liên tục trong 3 ngày.

b. Thể mãn tính:

- Gây tê xung quanh vùng viêm bằng Novocain (liều 20ml/ con), sau đó phẫu thuật lấy hết chất dịch mủ trong khối u nơi bị viêm ra.

- Đặt ống dẫn để vết thương tiết dịch viêm ra trong những ngày sau khi phẫu thuật.

- Dùng Penecilline bột bơm trực tiếp vào vết thương liên tục trong 1 tuần.

- Tiêm kháng sinh Amoxilline 20ml/ con/ ngày, liên tục trong 1 tuần. *Chú ý:* giữ vệ sinh sạch sẽ nơi vết thương và không sử dụng sữa trong suốt thời gian điều trị bệnh.

5. Phòng bệnh

- Nắm vững kỹ thuật khi tiêm thuốc cho bò, tránh gây những ổ viêm (áp-xe).

- Bố trí chuồng trại hợp lý, mật độ vừa phải. Tránh những kích động hoặc rượt đuổi làm bò bị va chạm, tổn thương.

http://nguoichannuoi.vn/benh-viem-co-tren-bo-sua-fm509.html