

## Phòng trị bệnh giun tròn trên lợn

Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị bệnh giun tròn trên lợn

### 1. Nguyên nhân

Do lợn ăn phải trứng giun sán ở phân, nước uống, thức ăn bị nhiễm (rau, các nguyên liệu, các thức ăn thừa...)

### 2. Triệu chứng

- Tùy lợn số lượng và mức độ của ấu trùng nhiều hay ít mà lợn có những dấu hiệu triệu chứng sau: kém ăn, gầy yếu, sút cân, niêm mạc trắng bạch, lợn bị tiêu chảy, mất máu, ... Trên lợn thông thường nhiễm giun đũa, giun phổi là nhiều nhất.

- Giun đũa: Ở lợn lớn triệu chứng không rõ ràng và phần lớn là mang và gieo rắc mầm bệnh. Bệnh nặng thường ở trên lợn con từ 2-5 tháng tuổi. Ấu trùng gây viêm phổi, lợn khó thở, giun sống trong ruột gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy thường xuyên, gầy ốm, nhiều khi ruột bị tắt hoặc có thể gây thủng ruột...

- Giun phổi: lợn từ 2-6 tháng tuổi hay mắc bệnh với các triệu chứng: chậm lớn, suy nhược, ho ( vào lúc sáng sớm và chiều tối) giai đoạn đầu lợn ăn bình thường nhưng chậm lớn, giai đoạn cuối ăn ít hoặc bỏ ăn, mệt mỏi, ít cử động, lợn thở khó khăn, gầy dần rồi chết...

### 3. Bệnh tích

Lợn bị nhiễm giun trên đường tiêu hóa thường xuất hiện giun. Nếu số lượng nhiều thường gây viêm nhiễm ở vùng chúng ký sinh.

- Giun đũa: Ấu trùng gây bệnh hoại tử ở gan, viêm phổi (hầu hết ấu trùng ở phổi), giun trưởng thành ký sinh ở ruột non và gây bệnh tích làm ruột non mỏng.

- Giun phổi: Ký sinh ở phổi và gây tổn thương phổi, viêm phế quản.

### 4. Phòng trị

- Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, khô ráo, cung cấp thức ăn, nước uống sạch, không cho các côn trùng vào chuồng lợn (giun đất là ký chủ trung gian lây bệnh giun phổi cho lợn).

- Ủ phân để tiêu diệt trứng giun đũa (không ủ phân gần chuồng nuôi).

- Định kỳ xổ giun cho đàn lợn:

+ Lợn con: 2 tháng xổ 1 lần

+ Lợn lớn: 5-6 tháng xổ 1 lần

- Dùng một trong các sản phẩm sau của ANOVA để phòng trị bệnh giun tròn như:

Chọn một trong các sản phẩm sau: Dùng một liều duy nhất

· NOVA LEVASOL: 1g/ 8kg thể trọng.

+ Lợn con: 2 tháng xổ 1 lần.

+ Lợn lớn: 6 tháng xổ 1 lần.

- NOVA LEVA: Tiêm bắp 1ml/15 kg thể trọng.
- + Lợn con: 2 tháng 1 lần
- + Lợn lớn: 3-4 tháng 1 lần.
- NOVA MECTIN 0,25%: Tiêm dưới da cho lợn con 1ml/8 kg thể trọng, 2 tháng 1 lần.
- NOVA MECTIN 1%: Tiêm dưới da cho lợn lớn 1ml/32 kg thể trọng, 2 tháng 1 lần.
- NOVA-FENBEN: 1g/ 7-8kg thể trọng, trộn với thức ăn liên tục 3-5ngày.

<http://nguoichannuoi.vn/benh-giun-tron-tren-lợn-fm594.html>