

## **Bón vôi, không dùng hóa chất đối với cây trồng có múi**

Cây có múi rất cần bón vôi, sử dụng phân hữu cơ và hạn chế hóa chất kích thích ra hoa... người trồng cây có múi cần chú ý như sau:

Bón vôi để cung cấp thêm calci cho cây và ngăn chặn sự suy thoái của đất, khử tác hại của mặn, ức chế sự phát triển nấm bệnh trong đất, phát huy hiệu lực phân hữu cơ, vô cơ và thuốc diệt cỏ. Thiếu calci cây yếu ớt dễ đổ ngã, sâu bệnh tấn công, trái hay bị nứt, nếu thiếu trầm trọng thì đọt lá non biến dạng, quăn queo rồi chết khô. Calci còn giúp cây trồng giải độc, tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi nắng nóng, phèn, mặn.

Vùng đất mặn có phèn nên bón vôi nung (CaO), còn đất mặn không phèn nên bón vôi thạch cao (CaSO<sub>4</sub>) với liều lượng khoảng 30 - 50 kg/sào. Vôi được rải đều trên đất liếp và tưới một lượng nước đủ để rửa mặn ra khỏi liếp. Sau vài năm mới bón vôi lại một lần và bón trước khi làm đất.

Phân hữu cơ giữ vai trò quan trọng trong trồng cây có múi, như tăng độ phì, tăng hàm lượng hữu cơ, tăng khả năng giữ nước, giữ phân, cải thiện độ ẩm đất. Đặc biệt, thúc đẩy phát triển hệ vi sinh vật đất. Giúp ổn định năng suất cây trồng, tăng chất lượng sản phẩm. Chú ý phân hữu cơ bón lót trước khi trồng, hàng năm, bón sau khi thu hoạch.