

## Sâu bệnh hại cây hồng xiêm

Trên cây sa pô thường xuất hiện nhiều loại sâu gây hại, làm giảm năng suất trái. Dưới đây là một số biện pháp phòng trừ.

### 1. Sâu đục trái

*Cách gây hại:*

Sâu phá từ lúc trái còn nhỏ đến sắp thu hoạch, gây thiệt hại trầm trọng, có thể làm rụng trái 30% và giảm phẩm chất trái 60%.

*Biện pháp phòng trừ:*

- Hái tiêu huỷ tất cả các trái bị sâu mùa trước còn sót lại, tránh lây lan cho mùa sau.
- Dùng 1 trong các loại thuốc sau: Karate, Cypet Alpha... phun định kỳ 2 lần/ngày.

### 2. Bọ đục cành

*Cách gây hại:*

Bù xè đục thành đường dưới vỏ và đục vào trong gỗ thân chính, hoặc các cành lớn làm cho cành gãy khi có gió mạnh. Cành cây bị chảy mủ từng đoạn và phân gỗ trắng đổ ra rơi trên mặt đất

*Biện pháp phòng trừ:*

- Tìm đường đục trên cây rồi dùng bông gòn tẩm thuốc trừ sâu (Karate, Basudin...) nhét vào rồi bơm nước cho thuốc thấm vào để diệt.
- Tránh gây thương tích trên thân và cành tạo đường xâm nhập cho bù xè.

### 3. Ruồi đục trái

*Cách gây hại:*

Khi trái chín, ruồi đẻ trứng và dòi đục vào ăn bên trong trái, làm trái thối, gây thiệt hại đáng kể.

*Biện pháp phòng trừ:*

- Thu hoạch khi trái vừa chín.
- Dùng chất dẫn dụ Metyleugenol trộn với thuốc sát trùng hoặc dùng chất Vizubon D để diệt ruồi.

### 4. Rệp sáp và rầy mềm

*Cách gây hại:*

Tấn công đọt non, lá và trái, làm giảm phẩm chất của trái.

*Biện pháp phòng trừ:*

Đây là đối tượng khó phòng trừ nên phun xịt định kỳ 5-7 ngày/lần, bằng các loại thuốc Trebon, Applaurd, Fenbis, Karate.

### **5. Bệnh đốm lá (do nấm *Pestalotia versicolor* Speg)**

*Triệu chứng:*

Trên lá có nhiều đốm bệnh, lúc đầu nhỏ, có màu nâu đỏ. Đốm bệnh lớn dần có hình tròn, đường kính 1-3 mm, có tâm xám trắng viền màu nâu sậm hay nâu đỏ. Nấm sẽ hình thành ổ nấm là những vết đen, nhỏ bằng đầu kim ở tâm đốm bệnh.

*Biện pháp phòng trừ:*

Phun các loại thuốc thông thường như hỗn hợp Bordeaux, Copper zine, Copper B, Zineb hay Benomyl ở nồng độ 2/1.000.

### **6. Bệnh thán thư (do nấm *Glomerella cingulata*)**

*Triệu chứng:*

Trên cả 2 mặt lá có các đốm bất dạng, màu vàng. Đốm bệnh sau đó biến sang màu xám trắng hay nâu nhạt và tạo nhiều ổ nấm đen trên đó. Nhiễm nặng, lá sẽ bị vàng.

*Biện pháp phòng trừ:*

Phun ngừa định kỳ hằng tháng bằng Zineb nồng độ 2/1.000.

### **7- Bệnh đốm lá (do nấm *Phaeophleosporaindica* Chim)**

*Triệu chứng:*

Trên lá có nhiều đốm tròn, nhỏ màu đỏ hay nâu đỏ, tâm màu xám trắng. Lá bệnh bị rụng sớm. Do lá bị rụng nhiều nên năng suất giảm.

*Biện pháp phòng trừ:*

Phun ngừa định kỳ hằng tháng bằng Zineb (2/1.000) hay Copper - Zinc (3/1.000).

### **8- Bệnh đốm rong (do rong *Cephaleuros virescens*)**

*Triệu chứng:*

Lá có các đốm tròn đường kính khoảng 0,5-1 cm; màu nâu trên có rêu phủ màu rỉ sắt như lớp nhung. Mặt dưới đốm bệnh có màu nâu nhạt.

*Biện pháp phòng trừ:*

Phun bằng các loại thuốc gốc đồng như: Bordeaux 1%, Copper - Zinc ở nồng độ 2-3/1.000.

### **9- Bệnh cháy bìa lá (do nấm *Fusicoccum sapoticola* Chim Rao)**

*Triệu chứng:*

Dọc theo bìa lá có các vết bất dạng, nhỏ, màu nâu. Sau đó các nhóm liên kết làm lá cháy từng mảng bất dạng.

*Biện pháp phòng trừ:* Phun zineb, Maneb, Benomyl ở nồng độ 2/1.000.