

## Kỹ thuật trồng bí đỏ Cô Tiên

Bà con nông dân có thể tham khảo kỹ thuật canh tác giống bí mới này. Thời vụ Các tỉnh phía Bắc: Gieo hạt từ tháng 10-11 đến tháng 1 năm sau; gieo đầu vụ cho năng suất cao hơn. Các tỉnh phía Nam có thể trồng quanh năm□

### 1. Làm đất□

Bí đỏ Cô Tiên có bộ rễ phát triển nên có khả năng chống hạn cao, muốn trồng bí đỏ đạt năng suất cao cần phải làm đất sâu và kỹ. Trồng bí đỏ theo những hốc thẳng hàng, hốc sâu 30-40cm, rộng 40-50cm, cách nhau từ 2-3m tùy đất xấu hay tốt, giữ mật độ 70-90 cây/sào. Mỗi hốc gieo 5-6 hạt cách đều nhau, gieo hạt xong lấp lên một lớp đất mỏng 2-3cm rồi tưới nước giữ ẩm□

### 2. Bón lót□

Chủ yếu là bón theo hốc, sau khi bỏ hốc, để 2-3 ngày cho hả đất rồi mới bón phân. Một sào bón 5-7 tạ phân chuồng hoai mục, 10-15kg super lân và 2kali clorua. Chú ý nếu đất đồi, đất chua (độ pH < 5) bón 20-25kg vôi bột khi làm đất. Bón phân vào hốc, bón xong trộn, đảo đều phân với đất, lại để 2-3 ngày nữa mới gieo hạt□

### 3. Chăm sóc□

Tưới nước, bón thúc: Bí đỏ Cô Tiên ở giai đoạn cây con cần tưới nước giữ ẩm đất 50-60% độ chứa ẩm đồng ruộng. Đến khi quả phát triển tưới thêm 1 lần nữa hoặc kết hợp với bón thúc bằng phân nước để quả đầy sức□

### 4. Bón thúc cho bí đỏ lấy quả vào hai thời kỳ□

Thời kỳ cây dài khoảng 40-50cm, bón phân đạm (khoảng 1-2kg phân ure) pha loãng tưới rộng xung quanh gốc, nếu tưới bằng phân chuồng ngâm thì xới đất xong hãy bón□

Thời kỳ ra nụ, ra hoa, tập trung bón đợt này để cây kết quả nhiều hơn, quả to và chắc. Bón 2-3kg đạm + 1-2kg kali + phân chuồng hoai mục 50-100kg/sào, rải phân quanh gốc (cách gốc 20-25cm) rồi lấy cuốc xáo đất ở rãnh và mép luống vun lấp phân đi, sau đó ít hôm thì tưới nước□

Khi bí đỏ bò dài trên dưới 1m thì dùng đất chặn đọt, cứ 2-3 đọt lại chặn 1 đọt để bí ra thêm rễ phụ, tăng thêm khả năng tìm kiếm thức ăn nuôi cây, đồng thời để cây bí bám chắc không bị giập dây, hại hoa quả sau này. Kết hợp bấm ngọn để bí ra nhiều nhánh. Mỗi cây chỉ để 2-4 nhánh. Hoa đực ở bí đỏ nhiều gấp 20 lần hoa cái nên khi hoa cái đã thụ phấn phải ngắt bớt hoa đực trên cành, tỉa bỏ những cành con kém phát triển, tỉa bỏ những đám lá già và lá mọc trùm lấp, chen chúc nhau cho thoáng để ong bướm dễ tìm hoa, tăng tỷ lệ đậu quả lên rất nhiều□

### 5. Thụ phấn bổ khuyết cho hoa cái□

Vào quãng 7-9 giờ sáng, bằng cách ngắt hoa đực vừa mới nở, nhân nhị của hoa đực lên đầu vòi nhụy hoa cái, hay lấy que cặp ít bông chàm nhẹ lấy phần ở nhị đực rồi quét lên nuốm nhụy cái. Được thụ phấn chắc chắn quả sẽ đậu□