

## **Hướng dẫn phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên lúa và cây trồng**

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha).  
Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

### **Trên lúa**

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha).  
Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC; Wellof 330EC; Altach 5EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

Phun bộ HAI BBC giai đoạn trước trổ và sau trổ (Beam 75WP + Bony 4SL + Carbenda sp 50SC) phòng trị bệnh đạo ôn lá; cháy bìa lá (bạc lá) do vi khuẩn, lem lép hạt, khô vằn, đốm nâu, vàng lá.

### **Trên cây trồng khác**

Cây chè: Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt. Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê: Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện. Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5WP phun đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện

Cây tiêu: Bệnh chết nhanh phun Manozeb 80WP. Rệp sáp rải Wellof 3GR (20 - 25 gr/gốc) khi rệp sáp xuất hiện gây hại.