

## **Bệnh thương hàn ở trâu bò**

**Triệu chứng:** Thời gian nung bệnh từ 3- 5 ngày, con vật kém ăn, mệt nhọc, sốt cao 40- 41oC kèm theo con run rẩy như hiện tượng sốt rét, chảy nước mắt, niêm mạc mắt đỏ sẫm, mũi khô. Gia súc bỏ nhai lại, nằm một chỗ, bị táo bón trong thời gian sốt, sau đó tiêu chảy dữ dội, lúc đầu phân sền sệt, mùi tanh màu vàng xám.

Sau vài ngày súc vật ỉa vọt cần cầu, có lẫn niêm mạc ruột lầy nhầy, đôi khi tróc niêm mạc từng mảng có lẫn máu màu đỏ sẫm. Trong thời gian bệnh số lần tiêu chảy có thể từ 5- 7 lần/ngày, con vật mất nước, mắt trũng sâu, niêm mạc nhợt nhạt, toàn thân gây rộc. Bệnh tiến triển trong thời gian 6- 10 ngày, cuối cùng con vật chết trong trạng thái kiệt sức.

**Bệnh tích:** Các hạch lâm ba sưng to, xuất huyết. Vách túi mật viêm dày lên, gan sưng to. Ruột non có những vết xuất huyết chạy dài theo chiều dọc, càng gần ruột già thì càng thấy rõ, niêm mạc ruột tróc ra làm thành ruột bị mỏng và chảy máu.

Ruột già bị xuất huyết và tróc niêm mạc nhiều hơn. Đặc biệt van hồi manh tràng và xung quanh có những vết loét bằng hạt đậu.

**Phòng bệnh:** Thực hiện tốt vệ sinh chuồng trại, tránh các yếu tố stress. Phát quang bụi rậm xung quanh khu vực trại. Tiêm phòng vacxin. Khi gia súc bị bệnh cần cách ly ra khỏi đàn.

**Trị bệnh:** Cần phối hợp các loại thuốc điều trị nguyên nhân, triệu chứng và trợ sức mới đem lại kết quả tốt. Kháng sinh điều trị bệnh: tiêm bắp liên tục 3 – 5 ngày; Vime-sone: 1ml/10kg thể trọng/ ngày hoặc Vimefloro FDP 1ml/10-15 kg thể trọng/ ngày; thuốc giảm cơn co thắt ruột và giảm số lần tiêu chảy: Atropin 1ml/ 10 kg thể trọng; thuốc trợ sức tăng sức đề kháng: Vime – Canlamin, Vitamin K, kết hợp cho uống Vime-Celectrolyte để chống rối loạn chất điện giải và mất nước do tiêu chảy nhiều.