

Kỹ thuật trồng cây tre lấy măng

Tre lấy măng cũng có nhiều loại: cây sắt gai, cây sắt trơn, tre mạnh tông, điền trúc, bát độ tạp giao..

□□□□Kỹ thuật trồng:

□□□□Cây tre lấy từ vườn nhân giống mỗi gốc phải có độ dài từ 20 – 30 cm, đường kính thân 3 – 6 cm, ở gốc có một ít rễ. Tốt nhất nên trồng từ tháng 1 là thời kì cây ở trạng thái ngủ. Mật độ trồng là 1.111 cây /ha cây cách cây 3x3 m hàng cách hàng 3 m, đào hố theo kích thước 70x70x30 cm. Hố trồng phải được đào trước khi trồng một tháng. Muốn cây đâm chồi và ra măng nhanh cần bón lót bằng bùn ao, đất mùn, đất phù sa hoặc phân chuồng hoai 15 – 25 kg trước khi đặt cây giống

□□□□**Cách trồng:** đặt cây thẳng đứng, nếu bón lót phân chuồng thì phải lấp đất bùn toi xấp lên trên lớp phân dày khoảng 5 – 10 cm sâu đó mới đặt cây giống. Dùng lớp đất mặt để lấp hố, lấp đất dày cách mặt hố 10 – 15 cm, phải dậm chặt từ ngoài vào sau đó phủ cỏ rác lên trên và tưới nước.

□□□□Chăm sóc bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh

□□□□Một năm trừ cỏ và xới đất 2 lần. Lần thứ nhất vào tháng 5 – 6, lần thứ 2 vào tháng 8 -9

□□□□**Bón phân:** có thể bón các loại phân nên bón vào mùa đông là tốt nhất. Lượng phân chuồng bón khoảng 22,5 – 37,5 tấn /ha. Đối với các loại phân đạm có hiệu quả nhanh như phân tổng hợp lân đạm nên bón vào mùa xuân – hè mỗi khóm bón 0,25 – 0,5 kg

□□□□Không được thả trâu bò vào vườn tre mới trồng

□□□□*Một số loại sâu bệnh chủ yếu và cách phòng trừ:

□□□□Sâu voi □ thường đẻ trứng vào 9 – 12 giờ trưa và 15 giờ đến tối vì vậy trong thời gian này ta nên tỉ bắt và tiêu diệt đạt hiệu quả cao nhất. Khi ấu trùng □ chuyển hóa thành sâu nên dùng thuốc Dipterex 90% pha loãng 500 lần để phun thuốc trừ sâu

□□□□Bệnh thối măng □ Dùng thuốc promidi pha loãng 5.000 lần cứ 7 ngày phun một lần để phòng bệnh