

## Phòng trừ sâu bệnh hại nhãn vải

### Nhện lông nhung hại vải (*Eriophyes litchii* Keifer):

☐☐☐☐ Đặc điểm gây hại: Nhện lông nhung phát sinh quanh năm, gây hại chủ yếu trên☐ các đợt lộc, nặng nhất vào vụ Xuân. Sâu non nở ra chích hút biểu bì mô mặt dưới lá hút nhựa, kích thích mô lá làm cho lá dị dạng có màu nâu đỏ như☐ nhung, mặt trên lá xoắn, phòng rộp phát triển không bình thường, làm cho lá quang hợp kém, dễ rụng.

☐☐☐☐ Phòng trừ:

☐☐☐☐+ Thu gom các lá rụng đem đốt, cắt bỏ các cành bị hại nặng đem đốt. Sau thu quả và vụ Đông cắt tỉa cho cây thông thoáng, làm vệ sinh vườn để giảm bớt điều kiện hoạt động của nhện.

☐☐☐☐+ Sử dụng thuốc: Regent 0,1%; Pegasus 0,1%; Ortus 0,1% có tác dụng diệt nhện trưởng thành tốt. Phun cho mỗi đợt lộc 2 lần: lần 1 nhú lộc, lần 2 lộc ra rộ.

### ☐☐☐☐ Bệnh hại vải

☐☐☐☐☐☐\* **Bệnh giả sương mai** (nông dân gọi là bệnh sương mai). Bệnh gây hại trên lá, chùm hoa và quả. Trên cành và cuống hoa, mô bệnh có màu nâu thâm đen và phát triển lan rộng ra xung quanh, làm cho cành và cuống hoa tóp lại, khô dần và gãy. Trên quả mô bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu xanh lục, sau lan dần trên mặt vỏ quả gây héo khô và chuyển màu thâm hoặc đen sẫm, trên mô bệnh được bao phủ 1 lớp nấm trắng dày, mịn.

☐☐☐☐☐☐ Bệnh thường phát sinh và gây hại nặng vào mùa xuân khi thời tiết ẩm, có mưa phùn ẩm ướt, trùng lúc cây đang ra hoa, hình thành quả và kéo dài cho tới khi thu hoạch.

☐☐☐☐☐☐ Biện pháp phòng trừ bệnh giả sương mai:

☐☐☐☐☐☐ Cắt bỏ các cành chồi hoa cũ không có quả do bị bệnh nặng và tiến hành vệ sinh vườn sau khi thu hoạch.

☐☐☐☐☐☐ Phun trừ nguồn bệnh lưu tồn trên mặt☐ đất☐ bằng☐ dung☐ dịch☐ Sunphat☐ đồng 0,2-0,3%.

☐☐☐☐☐☐ Khi cây ra hoa kết quả từ sau tháng 2 cho đến☐ khi quả chín, điều☐ tra thường xuyên, nếu☐ phát hiện thấy☐ triệu☐ chứng bệnh thì dùng thuốc☐ Ridomil☐ 72☐ MZ nồng độ 0,2% để phun, tùy theo điều kiện thời tiết nếu trời có mưa hoặc đêm nhiều sương cần phun tiếp lần 2, cách lần 1 từ 7-10 ngày.

☐☐☐☐☐☐\* **Bệnh thán thư**☐ Bệnh phát sinh gây hại trên lá, lộc non, trên các chùm hoa và quả.

☐☐☐☐☐☐ Trên lá, bệnh gây hại từ đỉnh lá trở xuống hoặc từ mép lá trở vào, mô bệnh màu nâu, ranh giới giữa mô bệnh và mô khỏe có đường viền màu nâu sẫm.

Trên lộc non, mô bệnh có dạng thấm nước, sau chuyển màu nâu tối. Trên hoa và quả non, mô bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu đen sau phát triển loang rộng ra, có dạng hơi lõm. Bệnh nặng làm cho hoa và quả bị rụng.

Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện trời ẩm và ẩm trong tháng 3 và 4, đặc biệt khi có mưa phùn trùng lúc cây đang ra hoa và hình thành quả non gây hiện tượng rụng hoa, rụng quả.

Biện pháp phòng trừ bệnh thán thư:

Tỉa cành tạo tán, cắt bỏ những cành tăm, cành vô hiệu tạo cho cây thông thoáng.

- Điều tra theo dõi vườn, đặc biệt khi thời tiết ẩm và ẩm thấy bệnh xuất hiện thì tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc như Bavistin 50FL hoặc Benlat 50WP nồng độ 0,1%.