

KHI LỢN CHỮA ĐỀ QUÁ NGÀY

Thời gian mang thai của lợn biến động từ 102-128 ngày. Vượt quá giới hạn trên được gọi là lợn chữa đề quá ngày và tất cả những trường hợp có chữa vượt quá giới hạn đó đều cần phải can thiệp.

Nhận biết triệu chứng: Quan sát thấy gần đến ngày đẻ lợn vẫn sa nằm sứa nhưng đến ngày đẻ lợn không có biểu hiện cắn ổ. Lợn ăn uống tốt, sau đó nằm sứa teo đi, âm hộ trở lại trạng thái bình thường.

Những ngày sau có thể có nhiều chất dịch chảy ra từ tử cung màu đỏ hoặc màu nâu nhạt lẫn mủ trắng hoặc toàn mủ trắng. Mỗi lần động dục thấy nước chảy ra nhiều hơn bình thường, bốc mùi thối, sau một thời gian có vẩy khô màu đen đó là trường hợp thai bị mềm nhũn. Nếu trường hợp thai bị chết vào mùa hè, vi khuẩn xâm nhập làm các tổ chức phân giải sinh ra khí, các khí sinh ra làm thai trương lên, tử cung dẫn mất tính co bóp. Dịch hồng chảy ra từ âm hộ có mùi thối. Lợn bỏ ăn, bụng chướng to rất dễ trúng độc và bại huyết. Đây là trường hợp thai bị thối rữa phải kịp thời lấy thai ngay.

Biện pháp tự can thiệp, điều trị: Đầu tiên cố định lợn nái, dùng ván hoặc cửa gỗ ép lợn vào một góc chuồng. Dùng dây buộc môn trên của lợn sauddos kéo treo dây lên hoặc vật lợn nằm ngửa để can thiệp. Dùng ống dẫn tin quân đưa qua cổ tử cung. Thụt từ 3-5 lít nước xà phòng 0,1-0,2% vào tử cung. Khi đã bom hết số nước xà phòng ấn định, dùng tay vỗ mạnh vào mông lợn, rút tinh quân ra và thả lợn.

Đỡ đẻ 12-48 giờ sau đó, lợn có biểu hiện cắn tổ đẻ. Đẻ bình thường không cần can thiệp trong quá trình đẻ. Nếu thai bị khô cứng nằm ở tử cung, nếu tử cung đã mở ta thụt tiếp nước xà phòng để tử cung không bó chặt lấy thai và làm trơn đường sinh dục sau đó lôi thai ra. Nếu 2 ngày chưa thấy lợn có biểu hiện có thể tiêm thuốc gây sảy thai như: Oestrogenum folliculinum với liều 2.000-4.000 UI hoặc dùng Hexoestrolum với liều 4.000-6.000 UI.

Các trường hợp thai bị mềm nhũn, thai bị thối rữa đều thụt được nước xà phòng và nhanh chóng lấy hết thai ra. Sau đó tử cung đã mở có thể tiêm bắp Oxytoxin với liều lượng 10-40UI nhằm tăng cường co bóp của tử cung tống thai đã chết ra ngoài.

Thụt rửa tử cung bằng thuốc sát trùng Rivanol 10/00 hoặc Lugol 0.1-0.2%. Tiêm Oxytoxin tống các chất bẩn ra ngoài; thụt dung dịch kháng sinh: Penicilin + Streptomycin 3-4 triệu đơn vị chống nhiễm trùng. Nếu có triệu chứng toàn thân

như: sốt, kém ăn... dùng kháng sinh điều trị từ 2-3 ngày, phối hợp với trợ sức trợ lực.