

HỘI CHỨNG BỆNH SỐT SỮA TRÊN HEO NÁI

1. Nguyên nhân:

Sau khi đẻ heo nái tê liệt nằm một chỗ, vắt không ra sữa. Bệnh có thể do sốt nhau, viêm vú, viêm tử cung hoặc do nái thiếu Canxi, năng lượng, thiếu Vitamin C.

2. Triệu chứng:

Sau khi đẻ 4 - 5 ngày, đột nhiên heo nái bỏ ăn, đi lại không vững, té ngã hoặc nằm mất lim dim. Heo bị tê liệt ở một vài vùng thân, bắp thịt giật, hai chân sau cứng. Heo mê man. lưỡi thè ra ngoài, mũi khô, da tái, bốn chân lạnh, thân nhiệt hạ dưới mức bình thường. Vú căng nhưng vắt không ra sữa.

3. Phòng bệnh:

Khẩu phần nái giai đoạn mang thai phải cân đối đạm khoáng và vitamin, do đó cần bổ sung vào khẩu phần :

- Embavit No6: 1kg/400kg thức ăn
- Calphovit : 100g/100kg thức ăn
- Biotin H –AD 50g/100 kgthức ăn

Kết hợp tiêm Vimekat 20ml/nái giai đoạn mang thai và Poly AD 5ml/nái vào 14 ngày trước khi đẻ.

4. Điều trị:

Tìm đúng nguyên nhân để điều trị:

- Nếu do sốt nhau: Tiêm Oxytocin liều 3 ml/ nái, tiêm nhắc lại 2 - 3 giờ /lần vào bắp thịt hay dưới da, sau đó tiêm Marbovitryl 1ml/10kg thể trọng để phòng nhiễm trùng.
- Nếu viêm tử cung ra nước nhờn mùi hôi thối: thì thụt rửa tử cung bằng dung dịch nước muối hoặc thuốc tím, sau đó tiêm các loại kháng sinh như Vime-sone, Marbovitryl kết hợp kháng viêm Ketovet.
- Nếu thiếu Canxi: thì tiêm tĩnh mạch Vime-Calamin 1ml/2kg trọng lượng