

Kỹ thuật trồng đậu đũa lùn

Đậu đũa là loại rau phổ biến ở thị trường Châu Á, với thời gian sinh trưởng ngắn nên có năng suất cao. Với kỹ thuật trồng đậu đũa lùn dưới đây sẽ giúp bà con nắm rõ kỹ thuật trồng và chăm sóc đậu đũa lùn tốt nhất cho mình.

I. Giống

Giống đậu đũa lùn (đậu đũa cây): thu hoạch ít lứa, không leo, trái ngắn 20-30cm, thịt chắc, ăn ngon và sai trái. Thời gian sinh trưởng 60-70 ngày.

Giống đậu leo: thân sinh trưởng vô hạn, canh tác phải làm giàn. Thời gian sinh trưởng 90-110 ngày. Có 2 giống là giống móng chim, tái có màu xanh đậm, chót đuôi trái có điểm tím, hạt màu đen; giống kia vỏ trái màu xanh nhạt và hạt màu trắng.

Hiện nay đa số trồng các giống mới cho năng suất cao của công ty giống Miền Nam, Trang Nông.

II. Kỹ thuật canh tác

1. Thời vụ gieo trồng

Vụ chính Đông -Xuân: Gieo từ tháng 10 –11 dương lịch, vụ này cho năng suất cao.

Vụ Hè-Thu: Gieo từ tháng 5 –6 dương lịch (vụ này năng suất thấp và nhiều sâu bệnh hại)

2. Làm đất

Mùa mưa lên liếp cao 15-20cm. Canh tác đậu đũa lùn gieo như các đậu khác. Khoảng cách 50×20 cm. Lượng hạt 40-50 kg/ha. Đậu đũa bò trồng khoảng cách 70-100cm x 20-30cm. Lượng giống 20-25 kg/ha.

3. Bón phân

Lượng phân bón cho 1 ha đậu như sau:

Urea: 250-300 kg

Super lân: 300-400 kg

KCl: 150-200 kg

Phân hữu cơ: 10-15 tấn.

Cách bón và thời kỳ bón:

Bón lót: bón trước khi gieo hạt. Dùng cuốc rạch hàng để bón phân trên liếp xong lấp đất trước khi gieo. Bón toàn bộ phân hữu cơ, tro trấu, 150-200 kg super lân và 30-40 kg KCl.

Bón thúc:

Tưới phân đậm: cây được 8-10 ngày tuổi, pha phân đậm nồng độ 2-4% tưới thúc để cây mọc nhanh.

Rãi phân lần 1: khi cây được 15-20 ngày tuổi, kết hợp với làm cỏ vun gốc. Cuộc 1 bên mép của hàng đậu phía bên sẽ cắm cây làm giàn bón 50-60 kg urê, phân lân còn lại, 30-40 kg KCl và dùng cuộc lấp phân lại.

Tưới phân đậm: Dùng urê nồng độ 3-5% tưới 2-3 lần giữa 2 lần bón rãi.

Rãi phân lần 2: khi cây được 40-45 ngày, bón phân nuôi trái với lượng 40-50 kg urê, 70-100 kg super lân, 30-40 kg KCl, rãi phân dọc theo bìa lúp.

Tưới phân đậm: phân urê và kali phối hợp pha tưới xen kẽ trong những lần thu trái để kéo dài thời gian thu hoạch trái, các lứa sau phát triển đều đặn, giảm số trái dị tật ở những đợt thu, có thể dùng NPK 16-16-8, không nên sử dụng đơn thuần phân urê.

Có thể sử dụng phân bón lá Bayfolan, HVP, Supermes... phun định kỳ 7-10 ngày/lần (không sử dụng khi cây có bệnh trên lá hoặc ở gốc thân).