

KỸ THUẬT TRỒNG HOA LAY ƠN THƯỜNG PHẨM

I/ Giới thiệu chung

- Tên khoa học: *Gladiolus Communis*.
- Họ: *Iridaceae* (Họ layon).
- Là cây thân thảo, sống nhiều năm, thân giả được tạo bởi các bẹ lá, lá xếp thành 2 dãy, mọc thẳng đứng. Hoa nở trong những cụm hoa hình xim. Hoa tươi từ 10 – 15 ngày.

II/ Kỹ thuật trồng

2.1. Các giống hoa layon trồng phổ biến:

- Layon trắng.
- Layon phấn hồng, phấn hồng lùn.
- Layon tím đậm, tím nhạt.
- Layon đỏ.
- Layon vàng.
- Layon san hô.

2.2. Thời vụ

- Các vùng lạnh có thể trồng quanh năm.
- Các tỉnh miền nam trồng trong vụ đông xuân, hoặc từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch hàng năm, chủ yếu phục vụ dịp tết nguyên đán.

2.3. Làm đất

- Đất được cày, bừa kỹ. Làm sạch cỏ dại và tàn dư của cây vụ trước
- Chọn những chân đất tốt, chủ động nguồn nước, khu vực nắng tốt, thông thoáng để trồng layon
- Thời gian đất nghỉ của vụ trước đến khi trồng layon ít nhất 20 ngày.
- Vệ sinh đất:
 - + Chuẩn bị chân ruộng, bơm nước vào ngập 2 lần, sau đó để khô rồi cày.
 - + Bón vôi cho đất: 80 – 100 kg/công, rắc đều sau đó xới xáo đều một lượt.
 - + Thông thường trồng layon trên hàng đơn để dễ chăm sóc.
 - + Lên liếp: chiều rộng x chiều dài = 0.8 m x chiều dài vườn (ruộng)
 - + K/c giữa các liếp 50 cm.
 - + K/c trồng: hàng cách hàng 25 cm x cây cách cây 20 cm
 - Độ sâu trồng củ: 10 cm

2.4. Phân bón: Lượng phân sử dụng cho 1.000 m² như sau:

- Phân hữu cơ hoai mục 1,2 tấn.
- Phân Urê 75 – 90 kg.
- Phân Super lân 60 kg.
- Phân KCl: 15 – 20 kg.
- Bổ sung thêm ít vi lượng như Cu, Mg, Zn.
- + Bón lót: toàn bộ phân chuồng + $\frac{3}{4}$ phân lân + 10 kg đạm + 6kg KCl
- + Bón thúc: Sau khi cây được 2 lá thì bón phần phân lân còn lại.
- Cứ sau 10 – 15 ngày bón thúc cho cây 1 lần.
- + Bón thúc lần 2: 10 kg Urê+ 3 kg Kali
- + Bón thúc lần 3: 15 kg Urê + 6 kg Kali

2.5.Chăm sóc

- Tưới nước 2 ngày/lần. Những ngày nắng, nóng tưới 2 lần/ngày.
- Sau khi trồng 7 – 10 ngày, mầm cây hoa mọc ra khỏi mặt đất, thường 1 củ có 1 mầm nhưng cũng có củ có nhiều mầm. Sau khi trồng 20 – 25 ngày, ta lật bỏ các mầm phụ, để lại 1 mầm tốt nhất (khỏe nhất). Lưu ý thao tác khi tỉa bỏ mầm, không được làm long gốc cây.
- Vun gốc: lần 1 khi cây được 3 lá.
- Lần 2 khi cây cao khoảng 50 cm, đồng thời cắm cọc để cây không bị đổ ngã.

Một số bệnh hại phổ biến trên cây hoa layon:

- Bệnh trắng lá: do nấm *Septoria* sp. gây ra. Thường gây hại trên lá già hoặc lá bánh tẻ, ban đầu vết bệnh chỉ như mũi kim chân, sau đó lan dần. Sử dụng Anvil 5 SC để phun phòng trị.
- Bệnh thối xám: do nấm *Sclerotinia* sp. gây ra, vết bệnh lúc đầu màu nâu vàng, gặp thời tiết ẩm ướt vết bệnh thối nhũn (không có mùi), bệnh làm thối lá, vàng lá và thân. Sử dụng Daconil 500 SC để phun phòng trị. Hoặc sử dụng Benlate để xử lý củ layon với nồng độ 2‰ trong thời gian 30 phút để phòng bệnh thối xám
- Bệnh héo vàng: do nấm *Fusarium* sp. gây ra, bệnh thường xuất hiện ở gốc thân hoặc cổ rễ cây hoa, thường có màu nâu làm khô tóp gốc thân.
- Bệnh héo vi khuẩn: Bệnh do vi khuẩn gây nên, làm thối gốc rễ. Vết bệnh có hình bất định, ủng nước, lá cây héo rũ. Cần vệ sinh vườn sạch, chọn những chân đất cao, khô ráo để trồng hoặc có thể sử dụng Streptomycin 100 – 150 ppm để phun phòng ngừa.

2.6.Thu hoạch

- Tùy theo nhu cầu sử dụng mà ta có thể thu hoạch hoa sớm hay muộn. Thông thường, khi có 1 – 2 búp hé nở là thu hoạch được.
- Khi cắt hoa cần để lại 2 – 3 lá để nuôi củ giống sau này.
- Cắt xong, dùng giấy báo hoặc giấy ximăng bao lại, để trong bóng tối và khuất gió, sau đó cho vào xô nước để bảo quản hoa.

(nguồn: khuyennongvn.gov.vn)