

Kinh nghiệm chống rụng hoa, quả non ở cây ăn quả

Cây ăn quả như nhãn, vải, xoài, cam, chanh, mận, dổi... thường có hiện tượng rụng hoa, rụng quả non (đó là rụng sinh lý). Có hiện tượng này là do một số nguyên nhân như thiếu nước, thiếu dinh dưỡng, nhiệt độ không khí cao, độ ẩm không khí cao và việc hình thành tầng rời giữa cuống và quả.

Để hạn chế hiện tượng rụng hoa, quả non ta cần chú ý một số điểm sau đây:

Trước khi cây ra hoa, phải đảm bảo đủ nước và đủ chất dinh dưỡng cho cây (lưu ý cây bắt đầu ra hoa không được tưới nước và bón phân nữa, nhất là các loại phân hóa học). Khi hoa đã nở xong đã có quả nhỏ, cây lại cần được tưới nước, bón phân, thời kỳ này tốt nhất là bón phân qua lá, phun lên lá, lên quả non hợp chất kích phát tố, kích thích sinh trưởng, bổ sung chất dinh dưỡng cho cây.

Để cây đậu quả nhiều, ngoài những điểm chú ý trên ta nên phun các hợp chất (gọi chung là thuốc đậu quả) rất sẵn có bán trên thị trường.

Sau khi phun thuốc đậu quả có thể quả đạt nhiều, ta nên bón thêm phân ở gốc cây, tốt nhất ở thời kỳ này là phân N.P.K, bón phân xong cần tưới nước cho phân tan dần, ngấm vào rễ dưới gốc cây.

Riêng với nhãn, vải nên phun 3 lần, lần 1 sau khi hoa tắt đã đổ quả, lần 2 khi thấy có quả non rụng, lần 3 phun trước khi hái quả khoảng 2 tuần và kết hợp phun thuốc trừ nấm bệnh và côn trùng (nhất là bọ xít).

Làm đúng như kinh nghiệm trên chắc chắn vườn cây sẽ đậu quả nhiều hơn, quả sẽ to đẹp hơn, chất lượng tốt hơn.

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam