

## Chống rụng quả sinh lý cho nhãn, vải

Trung và hạ tuần tháng 5, cây vải thường có đợt rụng quả sinh lý. Để hạn chế hiện tượng bất lợi này bà con cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật sau.

**Tưới nước đủ ẩm cho vải:** Giai đoạn này quả đang lớn nhanh, đảm bảo độ ẩm 70-75% độ ẩm đất ít nhất xung quanh tán vải. Nếu trời không mưa cần tưới đủ ẩm 10-15 ngày/lần. Nếu gặp khô hạn, các loại phân khoáng, phân trung vi lượng hoà tan chậm, rễ cây hút dinh dưỡng rất khó khăn. Cây thiếu nước, thiếu dinh dưỡng sẽ sinh ra tầng rời ở cuống quả, gây rụng quả sinh lý.

**Cung cấp đủ dinh dưỡng:** Thời kỳ này vải cần rất nhiều dinh dưỡng đặc biệt là kali để tổng hợp và vận chuyển chất hữu cơ về quả. Việc cung cấp phân khoáng hợp lý cho vải cần căn cứ vào tuổi của cây vải, mức độ sai của quả và chế độ dinh dưỡng của cây biểu hiện qua màu sắc của tán lá.

Lá có màu xanh đen biểu hiện cây thừa đạm cần bón thêm phân kali cho vải. Liều lượng 1-5kg/cây, bón dưới hình chiếu của tán lá, bón thành 4 hốc quanh tán cây, bón sâu 7-10cm.

Lá có màu xanh nhạt, xanh vàng bón phân NPK (12:5:10) hoặc đạm : kali tỷ lệ 1:1. Liều lượng: 2-5kg NPK hoặc 0,5-2kg đạm ure + 0,5-2kg kali clorua.

Lá có màu xanh trung bình (xanh màu lá chuối bánh tẻ). Bón phân với tỷ lệ 1đạm : 2kali. Liều lượng 0,5-2kg đạm ure + 1-4kg kali clorua. Bón phân dưới hình chiếu của tán cây. Bón theo hốc, 4 hốc cách đều 4 hướng cây, độ sâu bón phân 10cm.

Tốt nhất dùng sản phẩm vườn sinh thái + gói bám dính phun cho vải, nhãn 10-15 ngày/lần khắc phục hiện tượng rụng quả non, tăng 20-30% năng suất, quả nhãn, vải to, ngoại hình đẹp, ăn thơm, ngọt hơn.

Có thể phun chế phẩm: A-H503, Atonic hoặc K-H502 + Multy-K + chất bám dính cho vải 10-15 ngày/lần, vào thời kỳ này cũng làm giảm quá trình rụng quả sinh lý, tăng năng suất chất lượng quả vải cuối vụ.

**Phòng trừ tốt một số sâu bệnh chính:** Phun thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Fipronil (Regent 800WG, Rigell 800WG, Tango 800WG, Rhironil 800WG...) nồng độ 1,5g/20lít nước hoặc nhóm hoạt chất sinh học Abamectin (Actamec 20EC: Shepatin 36EC, Silsau 3,6EC...) 10ml/15lít nước phun ướt tán cây lúc quả lớn bằng hạt đậu có tác dụng trừ các loại sâu hại như: Sâu đục cuống quả, nhện lông nhung, bọ xít...

**Bệnh sương mai, thán thư làm thối và rụng quả non** tốt nhất dùng hai loại thuốc nội hấp: Amistar 250EC hoặc hỗn hợp: Aliette 80WP + Bavistin 70FL hoặc thuốc Ridomin gold 72WP + Carbenzim 50WP, phun khoảng 1-2 lần, mỗi lần cách nhau 15-20 ngày. Các loại thuốc nội hấp này sau khi phun 4-5 giờ thuốc được cây hấp thụ, lưu dẫn trong thân, lá có tác dụng phòng trừ bệnh thời gian dài 10-15 ngày, không sợ nước mưa rửa trôi.

*Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam*