

Kỹ thuật trồng lạc xuân

Kỹ thuật trồng

1. Lượng giống cho một sào Bắc Bộ (360m²): 7 - 8kg lạc củ. Vụ xuân gieo từ 15/1 - 25/2 dương lịch.

2. Làm đất và lên luống: Đất cần làm tơi xốp, sạch cỏ dại, lên luống rộng 1 - 1,5m, cao 25 - 30cm. Trên đất bãi thoát nước tốt có thể trồng theo băng, mỗi băng rộng 5-6m, rạch hàng theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Với giống cao cây, thân, lá phát triển thì gieo thưa hơn giống thấp cây, thân đứng. Trên đất tốt, thâm canh gieo thưa hơn trên đất xấu.

3. Bón phân

Bón đủ phân hữu cơ, lân và vôi. Trên đất bạc màu bón thêm kali. Lượng phân bón cho một sào Bắc Bộ gồm: phân chuồng 300 - 350kg; phân đạm 3 - 4kg; kali 3 - 4kg; lân 15kg; vôi bột 15kg. Vôi bón lót 50% trước khi rạch hàng. Dùng cuốc rạch sâu 5 - 7cm, hàng cách hàng 30 - 40cm, hàng ngoài cách mép luống 10 - 15cm, cây cách cây 10 - 15cm, gieo 1 hạt/hốc.

Phân hoá học gồm 15kg supe lân + 1,5-2kg kali + 1,5 - 2kg đạm, trộn đều và rải xuống rạch; phân hữu cơ bón sau cùng (300 - 350kg). Sau khi bón phân, lấp một lớp đất dày 2 - 3cm để hạt giống không bị tiếp xúc trực tiếp với phân.

Bón thúc khi cây có 2 - 3 lá thật: urê 1,5 - 2kg + 1,5 - 2kg kali + 4kg vôi bột. Sau khi lạc ra hoa rộ 7-10 ngày, bón nốt lượng vôi còn lại, không trộn vôi với loại phân nào khác.

4. Gieo hạt: Trước khi gieo nên phơi lại dưới nắng nhẹ 3 - 4 giờ. Gieo lúc có mưa nhỏ, đất ẩm, nếu đất khô nên tưới vào rạch để hạt dễ nảy mầm, gieo hạt cách xa phân bón lót 3-4cm, sau đó lấp đất dày 1-2cm phủ kín hạt.

5. Chăm sóc: Sau trồng 4-5 ngày, kiểm tra và trồng dặm những chỗ hạt không nỡ.

Xới lần 1: Khi cây có 2 - 3 lá thật (sau mọc 10 - 12 ngày), xới phá váng, không vun để tạo độ thoáng dưới gốc, giúp cành cấp 1 phát triển.

Xới lần 2: Khi cây có 7 - 8 lá thật (sau mọc 30 - 35 ngày), trước khi ra hoa và nên xới sâu 5-6 cm giữa hàng, giúp đất tơi xốp, thoáng khí, chú ý không vun gốc.

Xới lần 3: Xới và kết hợp vun gốc sau khi lạc ra hoa rộ 7 - 10 ngày.

Nếu thời tiết khô hạn thì cần tưới nước giữ ẩm để lạc phát triển, nhất là thời kỳ trước ra hoa và làm quả. Có thể tưới phun hoặc tưới vào rãnh ngập 2/3 luống, để nước ngấm đều rồi tháo cạn.

6. Phòng trừ sâu bệnh: Chủ động phòng trừ sâu bệnh bằng cách bón phân cân đối, chăm sóc hợp lý, áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời. Chú ý đề phòng đé, kiến, mối hại quả và bệnh héo xanh do vi khuẩn.

Nguồn: Kinh tế Nông thôn