

Phòng trị bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà

1. Nguyên nhân

Gây ra bởi virus thuộc họ Coronaviridae. Mọi lứa tuổi của gà đều mắc bệnh nhưng bệnh thường nặng hơn trên gà con. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường hô hấp, tiêu hóa, phân, dụng cụ chăn nuôi đã nhiễm mầm bệnh.

2. Triệu chứng:

- Ở gà con: ho, hắt hơi, có âm rít, chảy nước mắt nước mũi, gà yếu, ăn ít, thường chụm lại thành từng bầy quanh đèn sưởi, gà bị tiêu chảy.

- Ở gà đẻ trứng: thường gặp khi gà đang ở giai đoạn tỷ lệ đẻ cao nhất, gà có biểu hiện ho, hắt hơi, chảy nước mắt nước mũi, sản lượng trứng giảm tới khoảng 50% kéo dài trong 6-8 tuần, trứng méo mó, vỏ mỏng hay nhăn gợn sóng. Lòng trắng trứng mất tính nhớt.

- Gà giò (từ 3-6 tuần tuổi): gà tiêu chảy có nhiều nước.

Gà bệnh biểu hiện khó thở, chảy nước mắt, nước mũi

3. Bệnh tích:

- Trên cơ quan hô hấp: có nhiều chất nhầy bên trong khí quản, xoang mũi, túi khí viêm dày đặc, tế bào biểu mô bị bong tróc.

- Cơ quan sinh sản: ống dẫn trứng bị giảm kích thước, giãn nở các tuyến nhầy, ống dẫn trứng còn bị phù, xơ hóa, những nang trứng chưa chín cũng bị u nang, tế bào trứng rơi vào xoang bụng gây viêm màng bụng, trứng bị méo mó

- Cơ quan tiết niệu: Viêm thận kẽ sung và sung huyết, nhạt màu, ống dẫn tiểu chứa đầy urate, ống thận bị hoại tử.

4. Phòng, điều trị bệnh:

Bệnh do vi rút gây ra, hiện không điều trị được bằng kháng sinh. Vì vậy, thực hiện các biện pháp phòng bệnh là chính:

- Chủ yếu là phòng bệnh bằng vaccin:

+ Vaccin chết: thường dùng cho gà đẻ.

+ Vaccin sống: dùng cho gà con, gà giò.

- Vệ sinh thức ăn, nước uống sạch, tránh nhiễm bẩn.

- Khi phát hiện gà bị bệnh phải cách ly, đối với gà mái đẻ bị bệnh thì tốt nhất là nên loại thải.

- Tiến hành sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, lò ấp trứng...bằng một trong các sản phẩm sau: NOVACIDE, NOVASEPT, NOVADINE.

- Chuồng trại phải thông thoáng, mát, độ ẩm thích hợp...Những lúc giao mùa, chuyển chuồng, tiêm phòng phải chăm sóc tốt để tránh hiện tượng stress. Sử dụng sản phẩm sau để phòng chống stress: NOVA-STRESS, STREEBRAIN, T. CUM GIA SUC với liều 1,5g/ lít nước, dùng khi có dấu hiệu stress và dùng liên tục cho đến khi bình thường.

- Thường xuyên sử dụng một trong các sản phẩm sau để cung cấp chất dinh dưỡng, vitamin, tăng sức kháng bệnh: NOVA VITA PLUS, VITAMINC, MD B COMPLEX: 1g/kg thức ăn, dùng liên tục.