

Phòng trị bệnh viêm dạ dày đường ruột ếch xanh

1. Triệu chứng

- Giai đoạn đầu ếch tỏ ra mệt mỏi, không có sức bật khi nhảy lên, thích chui dưới bùn, đến giai đoạn cuối nhắm mắt duỗi chân nằm trên bờ không chịu xuống nước, nằm chỗ khuất vắng không ăn gì, trong vòng 7 – 10 ngày thì chết.

2. Nguyên nhân

- Trong suốt vòng đời ếch xanh, từ khi là nòng nọc, ếch con, ếch choai đến ếch trưởng thành đều có thể mắc bệnh viêm dạ dày đường ruột, đây là loại bệnh lây nhiễm gây tác hại nghiêm trọng, nguyên nhân gây bệnh có thể là do ếch ăn phải thức ăn ôi thiu biến chất, từ đó bị vi khuẩn xâm nhập gây bệnh.

3. Bệnh tích

- Mở ếch ra xem sẽ phát hiện ở dạ dày và đường ruột có hiện tượng tụ máu, viêm nhiễm, trong bụng không có thức ăn.

4. Phòng, điều trị bệnh

- Không cho ếch xanh ăn các loại thức ăn mất vệ sinh, biến chất, thường xuyên dọn dẹp thức ăn thừa, cố gắng cho ăn thức ăn mới và chất lượng tốt.

- Cứ 10 ngày rải toàn ao một lần thuốc tẩy với nồng độ từ 1 – 2 gam/mét khối, thường xuyên bổ sung thêm nước mới, bảo đảm thật tốt môi trường nước.

- Đối với ếch xanh mắc bệnh có thể cho ăn các loại thuốc như: Thuốc viêm dạ dày, Terramycin bằng cách trộn vào thức ăn cho ăn mỗi ngày 2 lần, mỗi con ếch ăn một nửa viên, cho ăn liền trong 3 ngày. Ngoài ra còn có thể trộn thêm một ít base tinh khiết vào trong thức ăn, đối với những con ếch cơ thể đã tương đối lớn, có thể bơm vào miệng Penicylin 2 vạn đơn vị hoặc Streptomycin 0,5 vạn đơn vị, với liều lượng 0,2 – 0,4 ml dạng thuốc nước.

- Chữa bằng Norfloxacin, tính theo mỗi kg ếch thì mỗi ngày trộn 20 – 30 mg vào thức ăn cho ăn liền 2 – 3 ngày.